



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
COMUNA AITA MARE
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA NR.62/2020
privind aprobarea amenajamentului pastoral al pajiștilor
permanente al comunei Aita Mare, județul Covasna

Consiliul Local al comunei Aita Mare,
întrunit în ședința sa ordinară din data de 27 noiembrie 2020,
analizând referatul de aprobare și proiectul de hotărâre privind aprobarea
amenajamentului pastoral al pajiștilor permanente al comunei Aita Mare, județul
Covasna, inițiat de primarul comunei Aita Mare,

având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Aita Mare și avizele comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului local al comunei Aita Mare;

luând în considerare Avizul nr.5692 din 28 iulie 2020 a Direcției pentru
Agricultură al județului Covasna,

văzând parcurgerea procedurilor de transparență decizională prevăzute la art.7
din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,
republicată,

în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.214/2017 pentru aprobarea
procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor
pastorale ale suprafețelor de pajiști permanente, precum și pentru modificarea și
completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1064/2013, prevederile art.6 și art.9
alin.(9) din Ordonanței de urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea,
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea
Legii fondului funciar nr. 18/1991 și art.8 și art.9 din Hotărârea Guvernului nr.1064/2013
privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea
pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.
18/1991,

în temeiul prevederilor art.129 alin.(14), art.139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit."a" din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. – (1) Se aprobă Amenajamentul pastoral al pajiștilor permanente al comunei Aita Mare, județul Covasna, anexa nr.1 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.

(2) Amenajamentul pastoral prevăzut la alin.(1) reprezintă actul administrativ prin care se gestionează pajiștile permanente din raza administrativ-teritorială al comunei Aita Mare, județul Covasna și este valabil pentru o perioadă de 10 ani.

Art.2. – Se aprobă Procedura de distribuire a extraselor din Amenajamentul pastoral al pajiștilor permanente al comunei Aita Mare, județul Covasna, anexa nr.2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă.

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează compartimentului agricol și de cadastru și compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare.

Aita Mare, la 27 noiembrie 2020

Președinte de ședință
Botond BARTHA



Contrasemnează
Secretar general al comunei
Istvan-Zsolt BARTA

S.C. EUROSILV S.R.L.

BRAȘOV

Anexa nr. 1
la Hotărârea 62/2019

AMENAJAMENTUL PASTORAL

AL PAIȘTIILOR PERMANENTE

COMUNA AITA MARE

JUDEȚUL COVASNA

BRAȘOV 2019



Cuprins

1. SITUAȚIA TERITORIAL – ADMINISTRATIVĂ ȘI ORGANIZARE.....	7
1.1 AMPLASAREA TERITORIALĂ A PĂȘUNILOR.....	7
1.2. DENUMIREA DEȚINĂTORULUI LEGAL.....	7
1.3. DOCUMENTE CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE. ISTORICUL PROPRIETĂȚII.....	7
1.4. GOSPODĂRIREA ANTERIOARĂ A PAJIȘTILOR DIN AMENAJAMENT.....	8
2. ORGANIZAREA TERITORIULUI.....	9
2.1. DENUMIREA TRUPURILOR CARE FAC OBIECTUL STUDIULUI.....	9
2.2. VECINĂȚĂȚI, LIMITE, HOTARE.....	9
2.3. CONSTITUIREA ȘI MATERIALIZAREA PARCELARULUI ȘI SUBPARCELARULUI.....	9
2.4. BAZA CARTOGRAFICĂ UTILIZATĂ.....	10
2.4.1. Evidența trupurilor de pășune pe planuri.....	10
2.4.2. Ridicări în plan.....	11
2.5. SUPRAFAȚA PĂȘUNILOR. DETERMINAREA SUPRAFETELOR.....	11
2.5.1. Suprafața pășunii pe categorii funcționale, destinații și folosințe.....	12
2.5.2. Organizarea administrativă.....	15
2.6. ENCLAVE.....	15
3. CARACTERISTICI GEOGRAFICE ȘI CLIMATICE.....	17
3.1. ZONA GEOGRAFICĂ ȘI RELIEFUL.....	17
3.2. ALTITUDINE, EXPOZIȚIE, ÎNCLINARE.....	17
3.3. CARACTERISTICI GEOLOGICE ȘI PETROGRAFICE.....	18
3.4. REȚEAUA HIDROGRAFICĂ.....	18
3.5. DATE CLIMATICE.....	18
3.5.1. Regimul termic.....	18
3.5.2. Regimul pluviometric.....	19
3.5.3. Regimul eolian.....	19
3.6. PEDOLOGIE.....	19
3.6.1. Descrierea tipurilor de sol.....	20
3.6.2. Buletin de analiză.....	21
4. VEGETAȚIA.....	23
4.1. DATE FITOCLIMATICE.....	23
4.2. DESCRIEREA TIPURILOR DE STAȚIUNE ȘI PĂDURE.....	23
4.3. TIPURI DE PAJIȘTE.....	24
5. CADRUL DE AMENAJARE.....	29
5.1. PROCEDEE DE CULEGERE A DATELOR DE TEREN.....	29
5.2. OBIECTIVE ECONOMICE ȘI SOCIALE.....	29
5.3. STABILIREA MODULUI DE FOLOSINȚĂ A PAJIȘTILOR.....	30
5.3.1. FUNCȚIILE PE CARE LE ÎNDEPLINESC PĂȘUNILE.....	30
5.4. BAZELE DE AMENAJARE.....	31
5.4.1. Terenuri cu vegetație forestieră.....	31
5.4.2. Pășuni.....	31
6. ORGANIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA, DOTAREA ȘI FOLOSIREA PAJIȘTILOR.....	33
6.1. ASPECTE GENERALE.....	33
6.2. TERENURI CU VEGETAȚIE FORESTIERĂ.....	33
6.2.1. Pășuni împădurite.....	33
6.2.2. Pășuni cu arbori.....	33
6.2.5. Descrierea lucrării.....	37
6.3. PĂȘUNI.....	38
6.3.1. LUCRĂRI PRELIMINARE OBLIGATORII DE PUNERE ÎN VALOARE A PAJIȘTILOR.....	38
6.4. METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A COVORULUI IERBOS PRIN FERTILIZARE.....	40
6.4.1. Tărlirea pajiștilor cu animale.....	40
6.4.2. Fertilizarea cu gunoi de grajd și alte îngrășăminte organice.....	40
6.4.3. Fertilizarea pajiștilor cu îngrășăminte chimice.....	41
6.5. METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE PRIN SUPRAÎNSĂMÂNȚARE SAU REÎNSĂMÂNȚARE A PAJIȘTILOR DEGRADATE.....	47
6.5.1. Principii de refacere parțială a covorului ierbos.....	47
6.5.2. Amestecuri de ierburi.....	47
6.5.3. Supraînsămânțarea pajiștilor.....	51



6.6. FOLOSIREA PAJIȘTILOR.....	51
6.6.1. Determinarea valorii pastorale	51
6.6.2. Stabilirea încărcării cu animale.....	52
6.7. CONSTRUCȚII ȘI DOTĂRI ZOOPASTORALE	53
6.7.1. Drumuri și poteci de acces.....	53
6.7.2. Alimentarea cu apă	53
6.7.3. Locuințe și adăposturi pentru oameni și animale	54
6.7.4. Lucrări tehnice și instalații (împrejmuiri)	54
7. DIVERSE	55
7.1. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A AMENAJAMENTULUI; DURATA ACESTUIA	55
7.2. COLECTIVUL DE ELABORARE A PROIECTULUI	55
7.3. INDICAREA HĂRȚILOR AMENAJAMENTULUI.....	55
7.4. BIBLIOGRAFIE.....	55
8. DESCRIEREA PARCELARĂ	57
8.1. PASUNI.....	57
8.2. DESCRIERE PARCELARĂ TERENURI CU VEGETAȚIE FORESTIERĂ	93
8.3. EVIDENȚA LUCRĂRILOR DE EXECUTAT ÎN URMĂTORII 10 ANI.....	105



Introducere

Obiectul prezentului studiu îl constituie amenajarea pășunilor împădurite și a terenurilor fără vegetație forestieră (pajiști) proprietatea publică și privată aparținând comunei Aita Mare Composesoratului Aita Mare, Parohiilor catolică, reformată și unitariană și persoanelor fizice de pe raza comunei Aita Mare, județul Covasna.

El cuprinde elemente legate de situația teritorial-administrativă, organizarea teritoriului, caracteristicile geografice, climatice și pedologice ale acestuia, precum și descrierea parcellară a vegetației forestiere și ierboase cu încadrarea ei în tipuri de stațiune și pădure conform normelor în vigoare.

Lucrarea cuprinde, de asemenea, planul decenal de îngrijire și exploatare a pajiștilor cu documentațiile tehnice necesare și planul decenal de recoltare a masei lemnoase de pe terenurile cu vegetație forestieră, conform normelor în vigoare.

Caracterul complex al prezentului studiu are ca bază obligativitatea impusă de Legea pășunilor încă din anul 1928 în România, apreciată și în prezent în multe din țările Comunității Europene și respectarea Normelor Tehnice Silvice privind gospodărirea vegetației forestiere de pe terenurile din afara fondului forestier național impuse de Codul Silvic și Ordinul 264 din 26.03.1999 al M.A.P.P.M. Mai recent obligativitatea întocmirii de amenajamente pastorale, după mai bine de două decenii, este stipulată de Legea 86/2014 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2013 pentru organizarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, care precizează la articolul 6, alineatul 1 că „*modul de gestionare al pajiștilor permanente se stabilește prin amenajamente pastorale*”.

Scopul prezentului amenajament pastoral constă în reglementarea și organizarea în timp și spațiu a producției erbacee din pajiști, potrivit condițiilor staționale locale și incidenței măsurilor de agromediu, astfel ca să se asigure o gospodărire rațională a acestora, având în același timp ca țintă și menținerea biodiversității și protejarea mediului înconjurător. Dezvoltarea durabilă a agriculturii este un proces complex ce se desfășoară prin și sub intervenția umană, care vizează dezvoltarea societății, materializarea lui bazându-se pe faptul că dezvoltarea durabilă a întregului este asigurată de dezvoltarea durabilă a fiecărei părți a activității umane (Marușca și colaboratorii, 2010).



1. SITUAȚIA TERITORIAL – ADMINISTRATIVĂ ȘI ORGANIZARE

1.1 AMPLASAREA TERITORIALĂ A PĂȘUNILOR

Situația trupurilor de pășune din punct de vedere teritorial

Tabelul 1.1.1.

Trupul de pășune		Teritoriul administrativ	Ocolul Silvic	Bazin hidrografic
Nr.	Denumire			
1.	Aita	comuna Aita Medie	Tălișoara	Olt
2.	Aita Mare			
3.	Dealul lui Matei			
4.	Dealul Belin			
5.	Lângă Olt			

1.2. DENUMIREA DEȚINĂTORULUI LEGAL

Deținătorii legal ai acestor pășuni sunt comuna Aita Mare, Composesoratul Aita Mare, Parohiile Catolică, Reformată și Unitariană și persoanele fizice de pe raza comunei Aita Mare, județul Covasna.

1.3. DOCUMENTE CARE ATESTĂ DREPTUL DE PROPRIETATE. ISTORICUL PROPRIETĂȚII

Pentru a scrie despre originea pășunilor este necesară o scurtă incursiune în istoria acestor locuri. În urma Reformei Agrare din 1945, aceste pășuni au devenit proprietatea comunei Aita Mare, județul Covasna. În anul 1949 în urma deciziei nr. 18 al Consiliului de Stat actualele pășuni au trecut în administrarea organelor agricole, aparținând Ministerului Agriculturii, moment în care s-au întocmit primele amenajamente silvopastorale.

În anul 1983 pășunile ce fac obiectul prezentului studiu au fost preluate de Ministerul Silviculturii prin Decretul prezidențial nr. 72/1983, care prevedea ca toate pășunile montane, intră în administrarea Ministerului Silviculturii. Cu această ocazie s-a întocmit în anul 1984 de către I.C.A.S. un studiu de amenajare, prevederile lui fiind puse în practică până în 1990 de către D.S. Covasna prin Ocolul Silvic Tălișoara și Ocolul Silvic Baraolt.

În anul 1993 aceste pășuni trec în proprietatea celor patru categorii de proprietari, documentele de proprietate fiind următoarele :

- **Ordinul Prefectului nr 1529 / 02.10.2002** pentru suprafața de 347,7 ha, proprietar comuna Aita Mare;
- **Titlu de proprietate nr. 47104 / 17.05.2013** pentru suprafața de 109,81 ha, proprietar Composesoratul Aita Mare ;
- **Titluri de Proprietate pentru suprafața de 25,0 ha, proprietari Parohiile Catolică, Reformată și Unitariană Aita Mare;**
- **Titluri de proprietate pentru suprafața de 2465,69 ha proprietari persoane fizice din comuna Aita Mare.**



Suprafața pășunilor analizate în prezentul studiu este de 2948,2 ha.
Proprietarii vor exercita asupra celor de mai sus, toate drepturile și obligațiile ce decurg din legislația în vigoare.

Copii după aceste documente sunt prezentate la capitolul *Anexe* al amenajamentului.

1.4. GOSPODĂRIREA ANTERIOARĂ A PAJIȘTILOR DIN AMENAJAMENT

După exproprierile efectuate în perioada 1907 – 1928, s-au întocmit primele studii de transformare pentru trupurile de pășune cuprinse în acest proiect. Prevederile acestor studii nu s-au respectat în totalitate fiind executate tăieri de transformare în pășunile împădurite situate pe terenuri cu înclinare mare, destinate protecției solului.

În anul 1949 se întocmesc noi amenajamente silvopastorale pentru toate trupurile de pășuni analizate. Aceste amenajamente au făcut propuneri de transformare fără a se executa și studiile corespunzătoare. Ele au avut planuri referitoare la ameliorarea și sporirea producției pajiștilor ca și pentru recuperarea unor terenuri degradate prin lucrări de împădurire sau recuperarea unor suprafețe pășunabile prin lucrări de curățire de arbuști și vegetație forestieră cu vârsta sub 20 ani.

Pentru menținerea producției pajiștilor s-au propus lucrări de scoatere a cioatelor, nivelarea mușuroaielor combaterea plantelor dăunătoare și toxice, iar pentru sporirea producției s-au propus fertilizări chimice, târlire și aplicarea de amendamente calcice pe toate suprafețele identificate la acea dată ca pășuni și pășuni cu arbori.

Prevederile acestui amenajament au fost aplicate însă într-o mică măsură. Realizări mai importante s-au semnalat în acțiunile de combatere a plantelor dăunătoare și toxice ca și în cea de recuperare a pajiștilor prin strângerea resturilor lemnoase sau curățirea terenurilor de specii invadatoare.

În anul 1972 a fost întocmit un "Studiu de inventariere și transformare a pășunilor împădurite". El a fost elaborat de I.C.A.S. și reprezenta un inventar al tuturor arboretelor cu consistența mai mare de 0,5 pentru care s-a făcut și un plan al lucrărilor de exploatare.

Prevederile acestui studiu au fost realizate în mică măsură, suprafața transformată în intervalul 1972 – 1983 fiind redusă.

În anul 1983 pășunile ce fac obiectul prezentului studiu au fost preluate de Ministerul Silviculturii prin Decretul prezidențial nr. 72/1983, întocmindu-li-se de către I.C.A.S. un studiu de amenajare în 1984. În perioada care s-a scurs de la acest amenajament, nu s-au efectuat lucrări care să aibă ca scop îmbunătățirea și exploatarea pajiștilor.



2. ORGANIZAREA TERITORIULUI

2.1. DENUMIREA TRUPURILOR CARE FAC OBIECTUL STUDIULUI

Situația trupurilor pe parcele și suprafețe

Tabelul 2.1.1.

Trupul de pășune		Parcele componente	Suprafața - ha -
Nr. crt.	Denumire		
1.	Aita	1, 2, 4- 33, 36 - 49	2740,6
2.	Aita Mare	3	46,0
3.	Dealul lui Matei	34	83,2
4.	Dealul Belin	35	27,9
5.	Lângă Olt	50 - 52	50,5
TOTAL		-	2948,2

2.2. VECINĂTĂȚI, LIMITE, HOTARE

Situația trupurilor pe vecinătăți

Tabelul 2.2.1.

Punct cardinal	N	E	S	V
Trup de pășune	1	2	3	4
Aita	Păduri și fânețe particulare	Păduri particulare	Păduri și fânețe particulare Pădure Composesorat Aita Medie	Terenuri arabile particulare
Aita Mare	Terenuri arabile particulare	Terenuri arabile particulare	Terenuri arabile particulare	Terenuri arabile particulare
Dealul lui Matei	Păduri particulare	Păduri particulare	Păduri particulare	Păduri particulare
Dealul Belin	Păduri particulare	Pășuni particulare	Păduri particulare	Păduri particulare
Lângă Olt	Terenuri arabile particulare	Terenuri arabile particulare	Pășuni și fânețe particulare	râul Olt

Limitele sunt naturale (culmi sau pâraie) sau convenționale (liziere de pădure sau limite cu proprietăți particulare materializate în teren cu garduri). Hotarul pășunii cu vecinii evidențiați în tabelul 2.2.1. a fost materializat în teren cu vopsea galbenă, folosind semnele indicate de instrucțiuni. Astfel, hotarul fiecărui trup de pășune a fost materializat cu semnul „I” la distanțe variabile, în funcție de orografia terenului, în așa fel încât de la un semn să fie vizibil următorul.

2.3. CONSTITUIREA ȘI MATERIALIZAREA PARCELARULUI ȘI SUBPARCELARULUI

La constituirea parcelarului s-a folosit ca bază parcelarul existent de la amenajarea din anul 1985 întocmit la preluarea pajiștilor montane de către Ministerul Silviculturii. El a fost modificat în funcție de situația actuală din teren, precum și în cazul unor parcele care depășeau 100,0 ha.

Limitele parcelare au fost materializate în teren cu vopsea galbenă, folosindu-se semnele convenționale cunoscute, respectiv semnul I pentru limitele parcelare și același semn așezat orizontal pentru limitele subparcelare.



Subparcela este unitatea teritorială de amenajare a pășunilor, constituind în același timp unitatea de bază pentru planificarea și executarea măsurilor de gospodărire. Criteriile de de constituire sunt: unitatea de relief, categoria de folosință, grupa funcțională, tipul de pajiște, specii erbacee abundente - dominante, etc.

La intersecția limitelor parcelare ca și la intersecția acestora cu hotarul trupurilor de pășune au fost amplasate borne (fig. 1) din piatră cu movilă de pământ. Numărul bornelor pe trupuri de pășune este evidențiat în tabelul următor:



Fig. 1. Bornă parcelară

Situația bornelor pe trupuri

Tabelul 2.3.1.

Trupul de pășune		Borne	
Nr.	Denumire		
1.	Aita	1 – 5, 1-10 bis, 5.2, 16.1, 17.1, 10 – 65, 30bis, 66bis, 217bis, 277bis, 198 (IV), 209(IV), 218(IV), 221(IV), 229(IV), 271(IV), 279(IV), 281(IV), 282(IV), 294(IV), 295(IV),	89
2.	Aita Mare	6 – 9	4
3.	Dealul lui Matei	244(IV), 245(IV), 258(IV), 259(IV), 262(IV), 264(IV)	6
4.	Dealul Belin	147(II), 312(II)	2
5.	Lângă Olt	11-17	7
TOTAL		-	108

S-au amplasat 108 borne numerotarea lor fiind prezentată în tabelul de mai sus. Pe limita trupurilor de pășune cu fondul forestier național, bornele aparținând acestuia au fost menționate și evidențiate pe hărțile trupurilor de pășune cu menționarea numărului unității de producție din care fac parte.

2.4. BAZA CARTOGRAFICĂ UTILIZATĂ

2.4.1. Evidența trupurilor de pășune pe planuri

Pentru organizarea teritoriului, determinarea suprafețelor și întocmirea hărților s-au folosit planuri restituite cu curbe de nivel la scara 1: 5.000. Aceste planuri au fost executate de I.G.F.C.O.T. în anul 1984 după aerofotografierea executată în anul 1977.

Planurile pe care au fost transpuse pajiștile situate pe unitatea administrativ teritorială Aita Mare sunt comune cu cele utilizate pentru întocmirea amenajamentului silvic al ocolului Tălișoara, și sunt evidențiate în tabelul de mai jos.



2.5.1. Suprafața pășunii pe categorii funcționale, destinații și folosințe.

Această evidență este prezentată în tabelul 2.4.1.1. În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 264 al M.A.P.P.M. din 26 martie 1999 pentru pășuni și terenuri cu vegetație forestieră, s-au folosit următoarele simboluri:

F.P. – pășuni (pajiști) cu funcție prioritară de producție.....	893,0 ha;
F.P. – fâneată cu funcție prioritară de producție.....	1536,0 ha;
F.P. – pășuni cu arbori cu funcție prioritară de producție.....	59,6 ha;
P.A. – pășuni cu arbori cu funcție prioritară de protecție a apelor.....	0,4 ha;
P.P. – pășuni împădurite cu funcție prioritară de producție.....	305,4 ha;
P.P. – fânețe împădurite cu funcție prioritară de producție.....	153,8 ha;
TOTAL GENERAL.....	2948,2 ha.




Repartiția pășunii pe categorii de folosință (ha)

Tab.2.5.1.1

Trup pășune		U.a.		Pășune	Fâneață	Pășune cu arbori		Pășune împădurită	Fâneață împădurită	Acoperirea erbacee	Supr. pășunabilă	
Nr.	Denum.	Nr.	Supraf.	F.P.	F.P.	F.P.	P.A.	P.P.	P.P.			
1	Aita	1A	5,9		5,9					5,9	5,6	
		1B	1,4					1,4				
		1C	1,8					1,8				
		1D	18,3		18,3							
		2	56,7		56,7					14,6	13,4	
		4	75,2		75,2					53,9	51,7	
		5A	24,5		24,5					72,9	67,8	
		5B	30,6	30,6						24,5	23,3	
		6A	40,2		40,2					20,5	18,0	
		6B	5,0	5,0						39,8	37,8	
		7	20,2	20,2						3,5	3,2	
		8A	17,0	17,0						17,2	16,3	
		8B	6,3			6,3				16,8	15,9	
		8C	27,2			27,2				5,0	4,6	
		9	31,6	31,6						14,4	13,5	
		10	25,7	25,7						30,0	28,5	
		11	42,5	42,5						18,0	17,0	
		12A	19,8	19,8						42,5	40,4	
		12B	21,3	21,3						19,4	18,0	
		12C	24,6			24,6				20,6	19,6	
		12D	5,9							16,0	14,9	
		13A	54,6	54,6						5,9		
		13B	11,8							11,8	35,5	32,7
		13C	6,1							6,1		
		13D	3,9							3,9		
		14A	16,3	16,3								
		14B	21,7	21,7							9,8	9,3
		14C	9,2	9,2							21,7	20,6
		14D	3,5								9,2	8,7
		15A	47,5	47,5						3,5		
		15B	19,7								33,2	30,9
		16A	53,5	53,5						19,7		
		16B	6,6							6,6	45,5	41,9
		16C	15,2							15,2		
		16D	9,0							9,0		
		17A	14,9	14,9								
		17B	5,1	5,1							14,4	12,2
		17C	19,3	19,3							5,1	4,9
		17D	48,7								9,6	8,8
		18A	12,3	12,3						48,7		
		18B	60,0								12,3	12,0
		19A	19,1	19,1						60,0		
		19B	49,8							49,8	16,2	15,0
		20A	41,9	41,9								
		20B	13,0								29,3	27,0
		21	56,7		56,7						13,0	
		22	52,3	52,3							31,2	28,0
		23A	59,5	59,5							41,8	38,4
		23B	12,5								53,5	48,7
		24A	43,4	43,4						12,5		
24B	8,8							8,8	39,1	34,8		
25A	46,6		46,6									
25B	30,4							30,4	34,9	31,4		
25C	9,7											
26A	66,4		66,4						9,7			
26B	18,6								56,4	49,6		
27A	66,9		66,9						18,6			
27B	33,0								63,6	59,1		
28A	26,7		26,7						33,0			
28B	15,0								26,7	25,9		
29A	37,4		37,4						15,0			
29B	22,6								36,2	35,2		
								22,6				



Trup pășune		U.a.		Pășune	Fâneață	Pășune cu arbori		Pășune împădurită	Fâneață împădurită	Acoperirea erbacee	Supr. pășunabilă	
Nr.	Denum.	Nr.	Supraf.	F.P.	F.P.	F.P.	P.A	P.P.	P.P.			
1	Aita	30	20,5		20,5					19,5	18,1	
		31	43,6		43,6					39,2	37,6	
		32	46,4		46,4					42,7	39,3	
		33	53,4		53,4					48,1	44,7	
		36A	53,2		53,2					42,6	39,2	
		36B	21,0						21,0			
		37	94,6		94,6					70,9	67,4	
		38A	46,3		46,3					37,0	33,3	
		38B	16,9									
		39	35,0		35,0				16,9			
		40	55,1		55,1					31,5	29,3	
		41	71,3		71,3					55,1	52,3	
		42	67,5		67,5					67,7	62,9	
		43	52,3		52,3					66,8	61,4	
		44A	102,0		102,0					52,3	49,2	
		44B	3,5							81,6	75,9	
		45	39,6		39,6					3,5		
		46A	96,9		96,9					39,6	38,4	
		46B	7,8		7,8					94,9	91,1	
		46C	0,5							5,5	5,0	
		47	83,0		83,0					0,5		
		48 A	0,9	0,9							78,8	70,9
		48 B	11,8	11,8							0,7	0,6
		49 A	3,5	3,5							10,6	
		49 B	1,5				1,5				3,5	3,3
		49 C	1,1							1,1	0,3	0,2
		49 D	1,7							1,7		
		49 E	2,1							2,1		
		49 F	0,3	0,3								
		49 G	17,8	17,8							0,1	0,1
		49 H	0,4					0,4			16,0	13,6
		49 I	18,2	18,2							0,1	0,1
Total trupul 1		-	2740,6	736,8	1490,0	59,6	0,4	300,0	153,8	18,2	14,6	
2	Aita Mare	3	46,0		46,0					1984,1	1833,1	
Total trupul 2		-	46,0	-	46,0	-	-	-	-	46,0	44,6	
3	Dealul lui Matei	34A	65,7	65,7						46,0	44,6	
		34B	12,1	12,1						65,7	58,5	
		34C	5,4							5,4	5,1	
Total trupul 3			83,2	77,8	-	-	-	5,4	-			
4	Dealul Belin	35	27,9	27,9						71,1	63,6	
Total trupul 4		-	27,9	27,9	-	-	-	-	-	20,9	19,2	
5	Lângă Olt	50 A	11,2	11,2						20,9	19,2	
		50 B	3,5	3,5						10,9	10,5	
		51	33,8	33,8						3,5	3,4	
		52	2,0	2,0						33,8	32,8	
Total trupul 5		-	50,5	50,5	-	-	-	-	-	2,0	1,2	
TOTAL GENERAL		-	2948,2	893,0	1536,0	59,6	0,4	305,4	153,8	50,2	47,9	
%		-	100	30	52	2	-	10	5	2172,3	2008,4	
										74	68	



2.5.2. Organizarea administrativă

Suprafața pășunilor studiate formează un canton pastoral, iar paza este asigurată de un paznic de pășuni.

Situația teritorial administrativă

Tabel 2.5.2.1

Canton		Parcele componente	Suprafață	
Nr.	Denumire		ha	%
1	Aita	1 – 52	2948,2	100
Total		-	2948,2	100

Arondarea se consideră corespunzătoare pentru asigurarea pazei și administrarea în bune condiții a pășunilor.

2.6. ENCLAVE

În cuprinsul pășunilor studiate nu există enclave.





3. CARACTERISTICI GEOGRAFICE ȘI CLIMATICE

3.1. ZONA GEOGRAFICĂ ȘI RELIEFUL

Din punct de vedere fizico-geografic, pășunile analizate se încadrează în zona Carpaților Orientali (I), Carpații Moldo – Transilvani (B), Obcinele Oltului (Brașovului) (f), Munții Baraolt (2).

Unitatea geomorfologică predominantă din cuprinsul unității este versantul, mai rar fiind lunca. Configurația terenului este în mare parte undulată, uneori fiind și plană.

3.2. ALTITUDINE, EXPOZIȚIE, ÎNCLINARE

Altitudinal, trupurile de pășune analizate sunt situate între 430 m (u.a. 52) și 920 m (u.a. 34C), altitudinea medie fiind de 680 m. Pe categorii de altitudine situația acestor pășuni se prezintă astfel:

- 430 - 500 m	164,8 ha (5%)
- 501 - 700 m	2641,1 ha (90%)
- 701 - 900 m	142,3 ha (5%)
TOTAL	2948,2 ha (100%)


Expoziția generală este determinată de direcția de scurgere a principalelor cursuri de apă din zonă. Numeroasele pâraie ce străbat trupurile de pășune determină la rândul lor o gamă largă de expoziții, lucru ce reiese din situația prezentată mai jos.

Repartiția pășunilor pe grade de insolație se prezintă astfel:

- expoziții însorite	1024,3 ha (35%)
- expoziții parțial însorite	1375,4 ha (47%)
- umbrite	548,5 ha (18%)
TOTAL	2948,2 ha (100%)

În cuprinsul pășunilor analizate, unitatea geomorfologică predominantă este versantul, lunca fiind rar întâlnit, iar configurația terenului este în cea mai mare parte undulată, doar ocazional fiind plană. Repartiția terenurilor pe care sunt situate pășunile, din punct de vedere al înclinării, se prezintă astfel:

- ușoară și moderată (< 16°)	783,2 ha (27%)
- repede (16 - 30°)	2165,0 ha (73%)
TOTAL	2948,2 ha (100%)



3.3. CARACTERISTICI GEOLOGICE ȘI PETROGRAFICE

În alcătuirea geologică a trupurilor de pajiști luate în studiu, se găsesc formațiuni din pleistocen și cretacicul inferior – neocomian, acesta fiind reprezentat de zona wildfis care cuprinde trei orizonturi:

- orizontul inferior – constituit din marne cenușii-albastrii;
- orizontul mediu – cuprinde calcare;
- orizontul superior – este reprezentat prin marne compacte cenușii-albastrii.

Formațiunile provenite din pleistocen prezintă un complex marnos gros de 100-300 m, constituit din marno-argile, argile nisipoase și tufuri.

Specificul geologic al substratului a influențat în mare măsură formarea și evoluția solurilor forestiere. Acestea s-au format de regulă pe seama straturilor superioare ale depozitelor de cuvertură care sunt de natură aluvială-fluviatilă-proluvială cu o alcătuire complexă pe versanți.

3.4. REȚEAUA HIDROGRAFICĂ

Teritoriul analizat face parte din bazinul hidrografic ale râului Olt, principalii afluenți în zona fiind pâraiele Aita, Pietrosul Mare, Cocosș afluenți de dreapta ai Oltului. Regimul hidrologic fiind influențat de condițiile fizico-geografice este echilibrat de tip carpatic. El se caracterizează printr-o alimentare pluvială intensă a pâraielor și debite relativ constante tot timpul anului. Se înregistrează un maxim primăvara la topirea zăpezilor și la începutul verii, când precipitațiile sunt mai abundente și un minim iarna, când aprovizionarea cu apă se face mai mult din pânza freatică.

3.5. DATE CLIMATICE

După clasificarea din „Geografia României” volumul I din 1983, teritoriul unității se află în zona climatică temperat continentală, în sectorul de provincie climatică I (cu influențe oceanice), ținutul climatic al munților joși, subținutul climatic al Carpaților Orientali, districtul pădurilor și pajiștilor montane, topoclimatele complexe ale Carpaților Moldo-Transilvani.

După Köppen, se încadrează în provincia Dfbx caracterizată printr-un climat boreal cu ierni reci, cu strat stabil de zăpadă iarna, cu temperatura medie a lunii celei mai calde sub 22°C, dar cel puțin timp de 4 luni ea depășește 10°C. Maxima pluviometrică la începutul verii, minima la sfârșitul iernii și precipitații suficiente tot timpul anului.

3.5.1. Regimul termic

Temperatura medie anuală este de 7,6° C cu o amplitudine medie anuală de 22,7°C. Durata sezonului de vegetație este în medie de la 15 aprilie la 20 octombrie iar temperatura medie a aerului în perioada sezonului de vegetație este de 14,5° C. În privința înghețurilor târzii și timpurii care pot aduce prejudicii vegetației forestiere prin înghețarea mugurilor, data medie a primului îngheț este 5 octombrie, iar data medie a ultimului îngheț 30 aprilie.

Datorită înghețurilor târzii relativ frecvente apare pericolul compromiterii fructificației, defolierilor și degerării plantulelor. În zonă există și pericolul formării chiciurii, la sfârșitul toamnei producând, de asemenea pagube exemplarelor tinere.




3.6.1. Descrierea tipurilor de sol

Brun luvic tipic: – întâlnit pe 89% din suprafață prezintă succesiunea orizonturilor pe profil Ao-EI-Bt-C. Acest sol s-a format pe substrat litologic alcătuit din marne și argile, generatoare de orizont Bt greu permeabil cu o structură poliedrică până la prismatică și cu un indice de diferențiere texturală (B/A) de la 1,2-1,5. Conținutul de humus scade de la 2-4% în orizontul Ao, la 0,7-1,5% în orizontul EI deci de la bogat humifer, la mediu spre slab humifer. Gradul de saturație în baze este mezobazic ($V=50-75\%$). Valoarea pH-ului este de regulă mai ridicată în orizontul Ao ($pH=4,9-6,2$) ca urmare a acumulării biologice și mai scăzută în EI (4,7-5,6). Aprovizionarea în azot total este de la slabă (0,10) la mijlocie (sub 0,30), iar în fosfor mobil slabă (2,5 mg/100g sol).

Brun luvic litic: - întâlnit pe 156,7 ha, este asemănător cu cel tipic, cu mențiunea că orizontul R este situat între 20 și 50 cm adâncime. Este un sol de bonitate mijlocie spre inferioară.

Brun eumezobazic tipic: - s-a identificat pe o suprafață de 162,5 ha, cu succesiunea orizonturilor pe profil Ao - Bv - C. S-a format pe un substrat bogat în roci calcice și feromagneziene. Este un sol slab acid la moderat acid cu $pH = 5,6-6,6$, moderat la foarte humifer, eubazic ($V=78 - 86\%$), mijlociu la foarte bine aprovizionat cu azot, slab la moderat aprovizionat cu fosfor, luto-nisipos la lutos. Bonitatea este mijlocie spre superioară pentru arboretele analizate, determinate de volumul edafic. Prezența scheletului uneori în proporții de 30-50% reduce volumul edafic și implicit bonitatea solului.



Buletin de analize
- Însușiri agrochimice de bază -
Nr.40/14.11.2019

Beneficiar: S.C. TEHNOSILV SRL

Nr. Cr	Nr. proba Lab.	ZONA DE RECOLTARE	Adanci me	pH (H ₂ O)	Ah	SB	V _{ah} (%)	ALUMINIU SCHIMBABIL, me/100g sol	HUMUS %	AZOT TOTAL %	FOSFOR mobil ppm	POTASIU mobil ppm
					me la 100 g sol							
1	2301	Aita Mare, CV P.1, u.a. 5A	0-20	7,7					6,55	0,336	51,8	224,0
2	2302	Aita Mare, CV P.2, u.a. 8C	0-20	5,3					3,13	0,165	27,5	46,0
3	2303	Aita Mare, CV P.3, u.a. 16A	0-20	5,1					5,88	0,300	42,5	98,0
4	2304	Aita Mare, CV P. 4, u.a. 21A	0-20	5,3					5,60	0,290	36,5	106,0
5	2305	Aita Mare, CV P. 5 u.a. 29A	0-20	5,2					3,97	0,206	30,5	91,0
6	2306	Aita Mare, CV P. 6 u.a. 41	0-20	6,0					5,04	0,259	38,0	166,0
7	2307	Aita Mare, CV P.7 u.a. 46A	0-20	5,7					3,58	0,187	35,0	72,0

Director,
Ec.Codruta Samarghitan

Chimist,
Ing.Petreanu Antonela

O.S.P.A. BRAȘOV
LABORATOR
NR. 23

Folosirea buletinului de analize în alt scop decât cel menționat în cererea cu nr. 1041/05.11.2019 se va face numai cu acceptul scris al prestatorului de servicii. Program cu publicul: luni-vineri 8.30-14.00. Adresa: Brașov, str. Calea Feldioarei nr. 20 B, cod postal 500483. Tel. 0268441332, e-mail: ospabv@gmail.com. Rezultatele se referă numai la proba analizată. Documentul de față este proprietatea laboratorului O.S.P.A. BRAȘOV. Reproducerea și difuzarea documentului aparține în exclusivitate laboratorului O.S.P.A. BRAȘOV. Copiile sunt numerotate și controlate.

4. VEGETAȚIA

4.1. DATE FITOCLIMATICE

Terenul analizat este situat la altitudini cuprinse între 430 – 920 m. Din punct de vedere al etajului de vegetație, pășunea se găsește în proporție de 100% în etajul deluros de gorunete, fâgete și goruneto-fâgete (FD3).

Din punct de vedere climatic, etajul aparține dealurilor și podișurilor, cu temperatura medie anuală de 8,5°C. Precipitațiile medii anuale sunt în jur de 650 mm. Numărul mediu al zilelor cu ploi variază de la 80 la 100 zile, cele mai frecvente precipitații înregistrându-se în perioada aprilie – iunie.

Tipurile de pajiște identificate în acest etaj sunt pe bază de *Festuca rubra* în combinație cu *Nardus stricta* și *Agrostis capillaris* și pe bază de *Trifolium pratense* și *Arrhenatherum elatius*.

Degradarea parțială a acestor pajiști s-a produs ca urmare a practicării în timp a pășunatului nerațional și a neaplicării unor lucrări agrotehnice absolut necesare pentru îmbunătățirea compoziției floristice. Aceste neajunsuri au dus la diminuarea cantităților de substanțe minerale pe profil și la accentuarea acidității solului, condiții în care *Nardus stricta*, *Deschampsia caespitosa* și *Calamagrostis epigeios* au pus stăpânire pe teren, înlăturând încetul cu încetul speciile valoroase.

4.2. DESCRIEREA TIPURILOR DE STAȚIUNE ȘI PĂDURE

Tipurile de stațiune și cele de pădure au fost stabilite pentru fiecare subparcelă în parte cu ocazia parcurgerii terenului. Evidența lor pe productivități este prezentată în tabelul 4.2.1.

Evidența tipurilor de stațiune și de pădure

Tabelul 4.2.1.

Tip de stațiune	Tip de pădure		Productivitate			Suprafață	
	Nr.	Denumire	Super. ha	Mijlociu ha	Inferior ha	ha	%
FD₃ – ETAJUL DE GORUNETE, FĂGETE ȘI GORUNETO - FĂGETE							
513.2 Deluros de gorunete Bm, podzolit edafic mijlociu, cu graminee mezoxerofite ± <i>Luzula</i>	523.1	Goruneto-fâget cu <i>Festuca drymeia</i> (m)	-	691,3	-	691,3	23
515.2 Deluros de gorunete Bm, brun slab – mediu podzolit, edafic mijlociu.	523.1	Goruneto – fâget cu <i>Festuca drymeia</i> (m)	-	387,5	-	387,5	13
523.2 Deluros de fâgete Bm, mediu podzolit edafic submijlociu, cu <i>Rubus hirtus</i>	428.2	Fâget de deal cu <i>Festuca drymeia</i> (m)	-	1869,4	-	1869,4	64
TOTAL	-	-	-	2948,2	-	2948,2	100
%	-	-	-	100	-	100	-

Descrierea tipurilor de stațiune

Principalul tip de stațiune și pădure din cuprinsul unității studiate, întâlnite pe 63% din suprafață, sunt prezentate mai jos:

5.2.3.2 Deluros de fâgete Bm, mediu podzolit edafic submijlociu, cu *Rubus hirtus*

Răspândit pe versanți predominant mijlocii, umbriți și semiumbriți, moderat înclinați, cu configurație în general ondulată. Depozitele de suprafață sunt provenite din roci furnizatoare



de material pământos și de schelet în sol (alternanțe sau amestecuri de marne și gresii, luturi cu pietriș și pietre calcaroase, nisipuri lutoase și luturi nisipoase).

Solurile sunt mijlociu profunde și profunde, slab scheletice și semisheletice.

Bonitate mijlocie pentru vegetația forestieră reprezentată de făgete și vegetația erbacee de pe pășuni.

Descrierea tipului de pădure:

428.2 - Făget de deal cu *Festuca drymeia* (m)

Productivitatea arboretelor din acest tip de pădure este mijlocie, determinată de substanțele nutritive, aciditatea activă, temperatura solului și volumul edafic. Se recomandă menținerea consistenței pline a arboretului, pentru asigurarea drenajului biologic a solului și acoperirea terenului.

4.3. TIPURI DE PAJIȘTE

În situația de mai jos este prezentat tipul de pajiște identificat și suprafața aferentă. Tipul de pajiște s-a indicat printr-o singură specie când aceasta a fost majoritară sau prin două specii când ele au avut participări < 50%.

Tipurile de pajiște identificate sunt următoarele:

1. <i>Festuca rubra</i> – <i>Agrostis capillaris</i>	251,7 ha (10%)
2. <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>	751,3 ha (30%)
3. <i>Festuca rubra</i>	129,7 ha (5%)
4. <i>Festuca rubra</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i>	344,8 ha (14%)
5. <i>Arrhenatherum elatius</i> – <i>Festuca rubra</i>	259,6 ha (10%)
6. <i>Festuca rubra</i> – <i>Nardus stricta</i>	70,7 ha (3%)
7. <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Calamagrostis epigeios</i>	149,5 ha (6%)
8. <i>Nardus stricta</i> – <i>Festuca rubra</i>	17,4 ha (1%)
9. <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i>	298,3 ha (12%)
10. <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Deschampsia caespitosa</i>	43,4 ha (2%)
11. <i>Calamagrostis epigeios</i>	12,1 ha (1%)
12. <i>Arrhenatherum elatius</i> - <i>Agrostis capillaris</i>	71,3 ha (3%)
13. <i>Arrhenatherum elatius</i> – <i>Dactylis glomerata</i>	67,5 ha (3%)
14. <i>Trifolium pratense</i>	3,5 ha (-)
15. <i>Deschampsia caespitosa</i>	18,2 ha (1%)
TOTAL	2489,0 ha (100%)

În continuare prezentăm descrierea tipurilor de pajiște menționate mai sus.

Festuca rubra* - *Agrostis capillaris

Festuca rubra

Agrostis capillaris* - *Festuca rubra

Aceste tipuri de pajiște sunt naturale și ocupă 1132,7 ha adică 45% din suprafața pășunilor analizate. Pe lângă cele două specii principale se întâlnesc specii însoțitoare precum: *Cynosurus c.*, *Anthranthum o.*, *Anthoxantum a.*, *Nardus s.*, *Briza m.*, *Poa p.*,



Agropyron r., *Calamagrostis e.*, *Luzula sp.*, *Dactylis g.*, *Achillea millefolium*, *Galium v.*, *Filipendula h.*, *Agrimonia e.*, *Centaurea sp.*, *Cichorium i.*, *Daucus c.*, *Primula v.*, *Fragaria v.*, *Alchemilla vulgaris*, *Taraxacum officinale*, *Plantago sp.*, *Lotus c.*, *Trifolium sp.*, *Medicago f.*, *Vicia c.*, *Lolium perenne*. etc. în proporții de 2 - 17%, dar și plante toxice și dăunătoare: *Ranunculus a.*, *Crocus v.*, *Cirsium*, *Dipsacus s.*, *Hypericum p.*, *Carduus a.*, *Euphorbia c.*, etc.. Aceste pajiști vegetează pe versanți cu înclinări și expoziții diverse, la altitudini de 500 - 700 m, pe soluri brune luvace, slab la semiscleritice.

Producția acestor pajiști este de 8 - 10 t/an/ha cu un grad de consumabilitate ce poate ajunge la 80%. Prin lucrări de mărire a potențialului productiv (aplicarea de îngrășăminte organice sau chimice), se poate spori producția de masă verde la 20 - 25 t/an/ha.

Festuca rubra* - *Nardus stricta

Nardus stricta* - *Festuca rubra

Aceste tipuri de pajiști ocupă 4% (88,1 ha) din suprafața analizată și au luat naștere ca urmare a exploatării neraționale a pajiștilor naturale cu *Festuca rubra* și *Agrostis capillaris*, în urma cărora *Nardus stricta* a invadat în parte suprafețele respective. Din acest motiv, acest tip de pajiște se poate considera parțial degradat, având în vedere că *Festuca rubra* ocupă încă o suprafață apreciabilă (15 - 40%). În acest tip de pajiște se întâlnesc specii însoțitoare precum: *Calamagrostis e.*, *Agrostis c.*, *Poa p.*, *Deschampsia c.*, *Cynosurus c.*, *Luzula s.*, *Lolium perenne*, *Trifolium repens*, *Lotus c.*, *Thymus m.*, *Fragaria v.*, *Achillea millefolium*, *Alchemilla vulgaris*, *Teucrium ch.*, *Veronica ch.*, *Ononis sp.*, *Fragaria vesca*, *Taraxacum officinale*, *Plantago sp.*, etc. în proporții de 1 - 18% dar și plante toxice și dăunătoare: *Euphorbia c.*, *Cirsium sp.*, *Ranunculus f.*, *Hypericum p.*, *Juncus sp.* etc.. Aceste pajiști vegetează pe versanți cu înclinări și expoziții diverse, de la 550 m altitudini la 700 m, pe soluri brune luvace.

Producția lor este de 3 - 5 t /an/ha masă verde, cu un grad de consumabilitate de 50%. Pentru readucerea lor la compoziția naturală și producția normală se impun aplicarea unor lucrări de ameliorare pentru îmbunătățirea compoziției floristice. Este indicat a se realiza un pășunat tarlatizat și aplicarea de îngrășăminte chimice ori naturale în vederea reducerii sau chiar a eliminării speciei *Nardus stricta* din compoziția acestor pajiști.

Agrostis capillaris* - *Calamagrostis epigeios

Agrostis capillaris* - *Deschampsia caespitosa

Aceste tipuri de pajiști ocupă 8% (192,9 ha) din suprafața analizată. Pe lângă speciile principale, se întâlnesc specii însoțitoare precum: *Poa p.*, *Cynosurus c.*, *Luzula s.*, *Lolium perenne*, *Trifolium repens*, *Lotus c.*, *Thymus m.*, *Fragaria v.*, *Achillea millefolium*, *Alchemilla vulgaris*, *Teucrium ch.*, *Veronica ch.*, *Ononis sp.*, *Fragaria vesca*, *Taraxacum officinale*, *Plantago sp.*, etc. în proporții de 1 - 18% dar și plante toxice și dăunătoare: *Euphorbia c.*, *Cirsium sp.*, *Ranunculus f.*, *Hypericum p.*, *Juncus sp.* etc.. Aceste pajiști vegetează pe versanți cu înclinări și expoziții diverse, de la 550 m altitudini la 700 m, pe soluri brune luvace.

Producția lor este de 3 - 5 t /an/ha masă verde, cu un grad de consumabilitate de 50%. Pentru readucerea lor la compoziția naturală și producția normală se impun aplicarea unor lucrări de ameliorare pentru îmbunătățirea compoziției floristice. Este indicat a se realiza un pășunat tarlatizat și aplicarea de îngrășăminte chimice ori naturale în vederea reducerii sau chiar a eliminării speciei *Nardus stricta* din compoziția acestor pajiști.



Festuca rubra* – *Arrhenatherum elatius

Arrhenatherum elatius* – *Festuca rubra

Agrostis capillaris* – *Arrhenatherum elatius

Arrhenatherum elatius* – *Agrostis capillaris

Arrhenatherum elatius* – *Dactylis glomerata

Acest tip de fâneață ocupă 1041,5 ha, adică 42% din suprafața totală și este cel mai bun tip de pajiște din cuprinsul unității analizate, având cea mai ridicată producție, datorită regimului de umiditate favorabil și solurilor bogate. Pe lângă specia principală, se întâlnesc specii însoțitoare, precum: *Dactylis g.*, *Agrostis c.*, *Brachypodium p.*, *Phleum ph.*, *Agropyron r.*, *Briza m.*, *Calamagrostis e.*, *Cichorium i.*, *Centaurea sp.*, *Daucus c.*, *Cichorium i.*, *Hieracium p.*, *Thymus m.*, *Achillea m.*, *Galium v.*, *Lolium p.*, *Holcus l.*, *Plantago l.*, *Agrimonia e.*, *Filipendula h.*, *Taraxacum of.*, *Trifolium sp.*, *Medicago sp.*, *Lathyrus p.*, cu un procent de participare de 1 până la 15% fiecare și specii dăunătoare și toxice precum: *Cirsium sp.*, *Dipsacus s.*, *Hypericum p.*, *Carduus a.*, *Juncus ef.*, *Carlina a.*, *Urtica d.*, *Ranunculus c.*, *Artemisia ab.*, etc, în procent de 1 – 6%. Productivitatea este foarte bună, atingând în medie 10 – 15 t/an/ha masă verde și un grad de consumabilitate de 90%, ce poate ajunge la 95%.

Trifolium pratense

Acest tip de pajiște este natural și ocupă 3,5 ha din suprafața. Pe lângă specia principală se întâlnesc specii însoțitoare precum: *Festuca rubra*, *Lolium perenne*, *Agrostis capillaris*, *Achillea millefolium*, *Alchemilla vulgaris*, *Taraxacum officinale*, *Plantago sp.*, etc. în proporții de 2 - 10%, dar și plante toxice și dăunătoare: *Carduus nutans*, *Deschampsia caespitosa*, *Urtica dioica*, etc.. Aceste pajiști vegetează pe versanți cu înclinări și expoziții diverse, la altitudini de 400 – 600 m, pe soluri mijlocii bogate în humus și calciu cu pH > 6.

Producția acestor pajiști este de 30 - 50 t/an/ha cu un grad de consumabilitate ce poate ajunge la 90%.

Deschampsia caespitosa

Acest tip de pajiște a apărut ca urmare a pășunatului abuziv și a scăderii fertilității solului pe pajiști cu *Festuca rubra* care au fost invadate pe suprafețe apreciabile de specia nevaloroasă *Deschampsia caespitosa* însoțită de *Nardus stricta*. Ocupă 18,2 ha, iar pe lângă specia principală se întâlnesc specii însoțitoare precum: *Festuca rubra*, *Nardus stricta*, *Achillea millefolium*, *Fragaria vesca* și *Plantago sp.*, în proporții de 1 - 10%

Valoare pastorală a pajiștilor de *Deschampsia caespitosa* este slabă.

Calamagrostis epigeios

Acest tip de pajiște a apărut ca urmare a pășunatului abuziv și a scăderii fertilității solului pe pajiști cu *Festuca rubra* care au fost invadate pe suprafețe apreciabile de specia nevaloroasă *Calamagrostis epigeios* însoțită de *Deschampsia caespitosa*. Ocupă 12,1 ha, iar pe lângă specia principală se întâlnesc specii însoțitoare precum: *Deschampsia c.*, *Agrostis c.*, *Festuca r.*, *Trifolium r.*, *Trifolium p.*, *Achillea m.*, *Fragaria v.*, *Plantago sp.*, *Agrimonia e.*, *Galium v.* în proporții de 1 - 15%, dar și plante toxice și dăunătoare: *Urtica d.* 3%, *Carduus m.* 1%, *Cirsium a.*, etc.

Valoare pastorală a pajiștilor de *Calamagrostis epigeios* este slabă.



Pentru o gospodărire mai ușoară și eficientă, tipurile de pajiște evidențiate la începutul cap. 4.3 au fost grupate în 7 tipuri tehnologice principale și anume:

- I. Festuca ± Agrostis (0 - 30%)
- II. Festuca ± Nardus (30 - 50%)
- III. Agrostis ± Calamagrostis ± Deschampsia (0 - 30%)
- IV. Arrhenatherum ± Festuca ± Agrostis ± Dactylis (0 - 30%)
- V. Trifolium (>50%)
- VI. Deschampsia (>50%)
- VII. Calamagrostis (>50%)

Tipul I are în compoziție ca specie principală *Festuca rubra*, iar în secundar *Agrostis capillaris* cu o participare de 0-30 %. În afară de acestea se mai întâlnesc ca însoțitoare diverse plante (*Cynosurus c.*, *Anthraganthum o.*, *Anthoxantum a.*, *Nardus s.*, etc.) sau plante dăunătoare și toxice (*Ranunculus a.*, *Crocus v.*, *Cirsium*, etc.). Având în vedere că în acest tip, procentul de *Nardus stricta* este redus, sunt necesare măsuri de întreținere și îmbunătățire a covorului ierbos.

Tipul II are în compoziție ca specie principală *Festuca rubra*, iar în secundar *Nardus stricta*. În afară de acestea se mai întâlnesc ca însoțitoare: *Calamagrostis e.*, *Agrostis c.*, *Poa p.*, *Deschampsia c.*, *Cynosurus c.*, *Luzula s.*, *Lolium perenne*, *Trifolium repens*, *Lotus c.*, sau plante dăunătoare și toxice (*Euphorbia c.*, *Cirsium sp.*, *Ranunculus f.*, *Hypericum p.*, *Juncus sp.* etc.). Având în vedere că în acest tip, procentul de *Nardus stricta* este relativ redus, măsurile de redresare sunt mai simple, iar cantitățile de îngrășăminte mai mici. Toate acestea împreună cu tehnologiile de îmbunătățire sunt prezentate în cap. 6.1.2.

Tipul III alcătuit din tipurile nr. 7 și 10 de pajiște, au în compoziție ca specie principală *Agrostis capillaris*, iar în secundar *Calamagrostis epigeios* și *Deschampsia caespitosa*, cu o participare de 0-30 %. În afară de acestea se mai întâlnesc diverse plante (*Poa p.*, *Cynosurus c.*, *Luzula s.*, *Lolium perenne*, *Trifolium repens*, *Lotus c.*, *Thymus m.*, *Fragaria v.*, etc.) sau plante dăunătoare și toxice (*Euphorbia c.*, *Cirsium sp.*, *Ranunculus f.*, *Hypericum p.*, *Juncus sp.* etc.). Tehnologia de urmat este evidențiată, de asemenea, în cap. 6.1.2.

Tipul IV alcătuit din tipurile nr. 4, 5, 9, 12 și 13 de pajiște, au în compoziție ca specie principală *Arrhenatherum elatius*, iar în secundar *Festuca rubra*, *Agrostis capillaris*, *Dactylis glomerata*. În afară de acestea se mai întâlnesc diverse plante (*Brachypodium p.*, *Phleum ph.*, *Agropyron r.*, *Briza m.*, *Calamagrostis e.*, *Cichorium i.*, *Centaurea sp.*, *Daucus c.*, *Cichorium i.*, *Hieracium p.*, *Thymus m.*, *Achillea m.*, *Galium v.*, *Lolium p.*, *Holcus l.*, *Plantago l.*, *Agrimonia e.*, *Filipendula h.*, *Taraxacum of.*, *Trifolium sp.*, *Medicago sp.*, *Lathyrus p.*, etc.) sau plante dăunătoare și toxice (*Cirsium sp.*, *Dipsacus s.*, *Hypericum p.*, *Carduus a.*, *Juncus ef.*, *Carlina a.*, *Urtica d.*, *Ranunculus c.*, *Artemisia ab.*, etc.). Sunt cele mai bune tipuri de pajiște, tehnologia de urmat fiind evidențiată, la cap. 6.1.2.

Tipul V alcătuit din tipul nr. 14 de pajiște, are în compoziție ca specie principală *Trifolium pratense* (>50%), iar în secundar *Festuca rubra*, *Agrostis capillaris*, *Lolium perenne*, cu o participare de 0-30 %. În afară de acestea se mai întâlnesc diverse plante (*Taraxacum officinale*, *Alchemilla vulgaris*, *Achillea millefolium*, *Plantago sp.*, etc.) sau plante dăunătoare și



toxice (*Carduus nutans*, *Deschampsia caespitosa*, *Urtica dioica*, etc.). Tehnologia de urmat este evidențiată, de asemenea, în cap. 6.1.2.

Tipul VI alcătuit din tipul nr. 15 de pajiște, are în compoziție ca specie principală *Deschampsia caespitosa* (>50%), iar în secundar *Festuca rubra*, *Nardus stricta*, cu o participare de 0-30 %. În afară de acestea se mai întâlnesc diverse plante (*Achillea millefolium*, *Fragaria vesca*, *Plantago sp.*, etc.) Tehnologia de urmat este evidențiată, la cap. 6.1.2.

Tipul VII alcătuit din tipul nr. 11 de pajiște, are în compoziție ca specie principală *Calamagrostis epigeios* (>50%), iar în secundar *Deschampsia caespitosa* și *Festuca rubra*, *Agrostis capillaris*, cu o participare de 0-30 %. În afară de acestea se mai întâlnesc diverse plante (*Agrostis c.*, *Festuca r.*, *Trifolium r.*, *Trifolium p.*, *Achillea m.*, *Fragaria v.*, *Plantago sp.*, *Agrimonia e.*, *Galium v.* etc.) Tehnologia de urmat este evidențiată, la cap. 6.1.2.

Conform ordinului MADR nr. 544/21.06.2013 privind metodologia de calcul al încărcării optime de animale pe hectar de pajiște, tipurile de pajiște menționate mai sus se încadrează în două categorii după cum urmează:

- Categoria V, care cuprinde tipurile I, II, IV și V, reprezintă tipuri de pajiște naturale, cu specii de valoare mare la medie care necesită îmbunătățiri;
- Categoria VI, care cuprinde tipul III, VI și VII, în care se încadrează tipurile de pajiști degradate sau parțial degradate, îmburuienate, cu vegetație arbustivă, soluri erodate și alte degradări ale solului și vegetației.



5. CADRUL DE AMENAJARE

5.1. PROCEDEE DE CULEGERE A DATELOR DE TEREN

Datele privind descrierea vegetației forestiere au fost culese cu ocazia parcurgerii terenului, în conformitate cu ghidul de întocmire a amenajamentelor pastorale, elaborat de Institutul de Cercetare - Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov în anul 2014. Astfel, pentru determinarea corectă a elementelor taxatorice a vegetației forestiere s-au amplasat în teren piețe de probă în zone reprezentative. Vârsta arborilor a fost determinată prin numărarea inelelor anuale pe cioate sau prin recoltarea de carote cu burghiul Pressler.

Tipurile de stațiuni și pădure ca și tipurile de sol au fost verificate în teren și comparate cu cele de la pădurea învecinată, aparținând fondului forestier național.

Tipurile de pajiște s-au stabilit prin relevee floristice pentru fiecare u.a. în parte.

Toate datele culese din teren, atât pentru vegetația forestieră cât și pentru pajiști au fost înregistrate în fișele de descriere parculară care formează capitolele 8.1. și 8.2.

5.2. OBIECTIVE ECONOMICE ȘI SOCIALE

Obiectivele social-economice și ecologice reflectă cerințele societății față de produsele și serviciile oferite de pășune. În teritoriul analizat există vegetație forestieră cu consistența 0,4 și peste, în care nu se vor propune lucrări silvice, proprietarul putând opta pentru includerea acestora în fondul forestier.

De asemenea, în cadrul proiectului s-au avut în vedere și următoarele obiective specifice :

- Îmbunătățirea calității aerului prin reținerea carbonului;
- Refacerea și îmbunătățirea calității solului;
- Refacerea echilibrului hidrologic;
- Asigurarea permanenței și stabilității biodiversității;
- Combaterea schimbărilor climatice prin diminuarea efectelor secetei.
- Protecția solului, diminuarea intensității proceselor de degradare a terenurilor și ameliorarea progresivă a capacității de producție a acestora sub efectul direct al culturilor forestiere;
- Ameliorarea progresivă a capacității de producție a terenurilor agricole degradate sau inapte altor folosințe;
- Asigurarea standardelor de sănătate a populației și protecția colectivităților umane împotriva factorilor dăunători, naturali și antropici;
- Îmbunătățirea aspectului peisagistic;
- Conștientizarea opiniei publice asupra importanței identificării și aplicării de soluții pentru prevenirea unor catastrofe naturale în viitor;
- Crearea unui curent național de opinie privind acțiunile de contracarare a unor probleme dramatice cu care se confruntă întreaga omenire la sfârșitul primului deceniu al secolului XXI: schimbările climatice, criza de apă, seceta, deșertificarea, epuizarea unor resurse, deșeurile, pierderea biodiversității, etc.

Prin realizarea prevederilor prezentului proiect contribuim la respectarea obligațiilor asumate de către România prin semnarea Protocolului de la Kyoto, conform Art. 2 alin. 1, par. a II – a, protecția și sporirea mijloacelor de absorbție și a rezervoarelor de acumulare a



gazelor cu efect de seră, care nu sunt reglementate de Protocolul de la Montreal, luând în considerare angajamentele rezultate din acorduri de mediu internaționale relevante, lucru care va genera pe lângă scopul principal de încetinire a procesului de încălzire globală și posibilitatea țării noastre de a obține un număr mai ridicat de certificate de CO₂ ce vor fi valorificate prin intermediul sistemului european de tranzacționare a cotelor emisiilor de bioxid de carbon.

5.3. STABILIREA MODULUI DE FOLOSINȚĂ A PAJIȘTILOR

Stabilirea categoriilor funcționale s-a făcut în conformitate cu normele în vigoare prezentate în ordinul nr. 264 /26.03.1999 al M.A.P.P.M. Suprafețele corespunzătoare acestor terenuri sunt evidențiate în tabelul 2.5.1.1., pe natură de folosință. În continuare, prezentăm categoriile funcționale și simbolurile care s-au folosit în prezentul studiu :

F.P. – pășuni (pajiști) cu funcție prioritară de producție.....	893,0 ha;
F.P. – fâneată cu funcție prioritară de producție.....	1536,0 ha;
F.P. – pășuni cu arbori cu funcție prioritară de producție.....	59,6 ha;
P.A. – pășuni cu arbori cu funcție prioritară de protecție.....	0,4 ha;
P.P. – pășuni împădurite cu funcție prioritară de producție.....	305,4 ha;
P.P. – fânețe împădurite cu funcție prioritară de producție.....	153,8 ha;
TOTAL GENERAL.....	2948,2 ha.

5.3.1. FUNCȚIILE PE CARE LE ÎNDEPLINESC PĂȘUNILE:

- funcție economică, care o constituie folosirea și valorificarea pajiștilor, apicultura, prelucrarea produselor animaliere, colectarea florei medicinale, etc.;
- funcție de protecție a mediului înconjurător prin conservarea biodiversității speciilor de animale și plante;
- protecția solului împotriva eroziunii, prin combaterea fenomenelor ce conduc la declanșarea acesteia;
- protecția apelor și capacitatea de reținere a apei și posibilitatea de a o ceda când plantele au nevoie de ea. „După pădure, pajiștea este cea mai importantă sursă de reținere și filtrare a apei pluviale (DUMITRESCU și colaboratorii, 1979);
- funcție de recreere, asigurată prin diversitatea speciilor de plante și animale de pe pajiști;
- fixarea anuală a azotului în agroecosistemele de pajiști și culturi de leguminoase, în jur de 80 kg/an/ha, reduce costurile de producție și riscurile de poluare cu nitrați.
- funcția de stocare a CO₂ în jur de 4,7 t/an/ha în agroecosistemele de pajiști permanente și 4,2 t/an/ha, în cele temporare, de unde rezultă că cele cca. 4,9 milioane de pajiști permanente din țara noastră pot stoca o cantitate de aproximativ 23 milioane tone CO₂.



5.4. BAZELE DE AMENAJARE

5.4.1. Terenuri cu vegetație forestieră

5.4.1.1. Tratatamentul

Pentru vegetația forestieră cu consistență 0,2-0,3 se vor propune tăieri de reducere a consistenței, iar pentru cea cu consistență peste 0,4 va fi inclusă în fond forestier, pentru aceasta urmând a se întocmi amenajament silvic.

5.4.2. Pășuni

5.4.2.1. Durata sezonului de pășunat

Momentul începerii pășunatului rațional se face când:

- înălțimea covorului ierbos este de 8 – 15 cm;
- înălțimea apex-ului (conul de creștere al spicului la graminee) este de 6 – 10 cm;
- înflorește pădăria (*Taraxacum of.*), în primăvară, care este un adevărat fitotermometru.

Având în vedere altitudinea medie a teritoriului analizat de 680 m și zona în care este amplasat (zona de deal, etajul pădurilor de șleau), perioada de pășunat este de 150 zile. Sezonul de pășunat începe la 15 mai și se sfârșește la 15 octombrie.

Încetarea pășunatului se face cu 3 – 4 săptămâni înainte de apariția înghețurilor permanente la sol.

5.4.2.2. Numărul ciclurilor de pășunat

Numărul ciclurilor de pășunat este egal cu numărul cosirilor de iarbă matură, care se poate face. Ciclul de pășunat reprezintă perioada de timp de la începutul pășunatului pe o tarla până la începutul pășunatului refacere a ierbii.

Pentru pășunile cu sezonul de vegetație de 120 – 150 zile, se consideră posibile 3 – 5 cicluri de pășunat de 40 zile fiecare, din care 5 – 6 zile pentru pășunat și 34 – 35 zile pentru refacerea ierbii.

5.4.2.3. Producția de masă verde

Producția de masă verde la hectar a pajiștilor studiate este de 8,4 t /ha. Cantitățile menționate reprezintă producția globală de masă verde, ce trebuie diminuată cu coeficientul de consumabilitate, pentru a obține producția reală. Acest coeficient a fost stabilit în funcție de tipul de pajiște (compoziția floristică) după normele în vigoare și după indicațiile specialiștilor pratologi și are valoarea de 81% pentru tipurile de pajiște analizate.

Prin lucrările propuse în prezentul studiu, se estimează că în următorii ani producția de masă verde la hectar va ajunge la 12-15 t /ha, iar coeficientul de consumabilitate mediu la 85%.



5.4.2.4. Capacitatea de pășunat

Aceasta reprezintă numărul de animale care se pot repartiza la 1 ha pășune, funcție de producția acesteia și de calitatea nutrețului. La baza determinării capacității de pășunat au stat normele actuale de furajare a animalelor și se calculează cu relația:

$C_p = P / R \times D$, în care :

C_p = capacitatea de pășunat

P = producția reală de masă verde la hectar

R = necesarul de iarbă verde pentru o unitate vită mare (UVM) - 65kg/zi

D = durata optimă de pășunat, care în cazul nostru este de 150 zile

S-a considerat necesarul de iarbă pe zi pentru o unitate vită mare de 65 kg, producția de masă verde 8400 kg /ha, de unde rezultă capacitatea de pășunat actuală de 0,86 UVM/ ha.

Stabilirea cât mai exactă a capacității de pășunat are o importanță deosebită în ceea ce privește buna și raționala exploatare a pajiștilor. Se știe că o pajiște prea încărcată duce la degradarea ei, în timp ce subîncărcarea cu animale este generatoare de pierderi.



6. ORGANIZAREA, ÎMBUNĂTĂȚIREA, DOTAREA ȘI FOLOSIREA PAJIȘTILOR

6.1. ASPECTE GENERALE

La data întocmirii amenajamentului suprafața pășunilor (producătoare de masă verde) este de 2489,0 ha, iar a suprafeței pășunabile de 2008,4 ha. Aceasta din urmă reprezintă suprafața din acoperirea erbacee (2172,3 ha), diminuată cu procentul plantelor dăunătoare și toxice existente la momentul actual pe suprafața pajiștilor.

Prin aplicarea unui complex de lucrări (scos cioate, defrișarea vegetației arbustive și forestiere cu vârsta ≤ 20 ani), privind mărirea capacității de pășunat se estimează că la sfârșitul deceniului suprafața pășunabilă va crește cu 421,6 ha, ceea ce va însemna un spor important de masă verde.

6.2. TERENURI CU VEGETAȚIE FORESTIERĂ

6.2.1. Pășuni împădurite

Pășuni împădurite sunt socotite terenurile acoperite cu vegetație forestieră a cărei consistență este egală sau mai mare de 0,4. În cuprinsul pășunilor analizate această categorie ocupă 459,2 ha, adică 16% din suprafața totală.

Menționăm că prin prezentul studiu nu se urmărește transformarea pășunilor împădurite în pajiști, ci păstrarea și tratarea lor în conformitate cu cerințele proprietarului cu respectarea normelor privind gospodărirea vegetației forestiere din afara fondului forestier. Rolul important pe care îl are vegetația forestieră ca factor determinant în menținerea calității mediului, actualele reglementări privind gospodărirea vegetației forestiere impuse de Codul silvic, valoarea economică a lemnului și, nu în ultimul rând abundența regenerării naturale de pe unele suprafețe au determinat proprietarul să-și revizuiască atitudinea față de pădure, să urmărească conservarea celor existente și chiar să mărească suprafețele cu pădure, redimensionând eficient suprafețele pășunabile conform necesităților.

În tabelul 6.2.3. se prezintă structura vegetației forestiere pe clase de vârstă, de unde rezultă că majoritatea arboretelor se încadrează în clasa a II-a (42%) și a III-a (34%).

În nici unul dintre aceste arborete nu se propun lucrări silvice întrucât conform art. 2, alin. 2 din legea 46/2008 – Codul Silvic, republicată, cu modificările ulterioare, pășunile împădurite cu consistența mai mare sau egală cu 0,4 vor fi incluse în fond forestier, pentru acestea urmând a se întocmi amenajament silvic.

6.2.2. Pășuni cu arbori

Pășunile cu arbori sunt terenurile cu vegetație forestieră a cărei consistență este cuprinsă între 0,2-0,3. Această categorie de pășuni însumează 60,0 ha ceea ce reprezintă 2% din suprafața totală a terenurilor analizate.

Această categorie provine din pășunile împădurite care în decursul anilor au fost supuse procesului de transformare. În cele mai multe cazuri, acest proces este terminat, dar sunt câteva situații în care, din diferite motive, transformarea nu a fost finalizată. În aceste unități amenajistice, s-a propus reducerea consistenței până la limita admisă de norme (0,1-0,2), în arboretele unde panta terenului o permite, încheierea acțiunii de transformare și în altele, unde condițiile din teren nu permit, reducerea volumului doar cu 33-35%.



Prin executarea tăierilor de reducere a consistenței, suprafața rezultată va fi redată circuitului pastoral, în zone cu înclinarea mai mică a terenului, lucru ce favorizează practicarea unui pășunat intensiv și creează acel ambient necesar animalelor pe pășune.

În arboretul din u.a. 49 H, în suprafață de 0,4 ha, reprezentat de un gorunet cu vârsta de 140 ani și consistența de 0,3, nu se vor executa tăieri de reducere a consistenței dat fiind faptul că arboretul are funcția de protecție a apelor.



Situația terenurilor cu vegetație forestieră

Tabelul 6.2.3.

Nr	Denumire	U.a.		Suprafața pe specii												Categorie funcțională		Înclinare (g)		Clasa de vârstă							Categorie de consistență		
		Supr.	Nr.	ha	10	18	27	36	45	54	63	72	81	90	100	ha	ha	16-30	> 30	1	2	3	4	5	6	7	0.2 - 0.4	0.5 - 0.6	≥ 0.7
1	1B	1,4	1,0	1,0	0,1	0,3												1,4	1,8	1,8	1,4								
	1C	1,8	1,8	1,8																6,3									
	8B	6,3	27,2	2,7																27,2									
	8C	27,2	2,7																	27,2									
	12C	24,6	2,5																	24,6									
	12D	5,9	1,8																	5,9									
	13B	11,8	5,9																	11,8									
	13C	6,1	0,6																	6,1									
	13D	3,9																		3,9									
	14D	3,5	1,7																	3,5									
	15B	19,7	3,9																	19,7									
	16B	6,6	0,6																	6,6									
	16C	15,2	9,1																	15,2									
	16D	9,0	1,8																	9,0									
	17D	48,7	19,5																	48,7									
	18B	60,0	18,0																	60,0									
	19B	49,8	34,9																	49,8									
	20B	13,0	5,2																	13,0									
	23B	12,5	10,0																	12,5									
	24B	8,8	3,5																	8,8									
	25B	30,4	12,2																	30,4									
	25C	9,7	2,9																	9,7									
	26B	18,6	7,4																	18,6									
	27B	33,0	9,9																	33,0									
	28B	15,0	7,5																	15,0									
	29B	22,6	6,8																	22,6									
	36B	21,0	4,2																	21,0									
	38B	16,9	6,8																	16,9									
	44B	3,5																		3,5									
	46C	0,5																		0,5									
	49B	1,5																		1,5									
	49C	1,1	0,7																	1,1									
	49D	1,7	1,2																	1,7									
	49E	2,1	1,7																	2,1									
	49H	0,4																		0,4									
Total Tr. 1		513,8	185,8	1,4	7,9	109,1	41,2	74,6	10,1	4,0	2,6	21,3	55,8	455,3	0,4	58,1	66,3	447,5	0,0	8,6	218,9	178,0	1,1	36,3	16,6	59,7	60,0	12,4	441,4
3	Dealul lui Mater	5,4																											
Total Tr. 3		5,4																											
TOTAL GENERAL		519,2	185,8	1,4	7,9	114,0	41,2	75,1	10,1	4,0	2,6	21,3	55,8	460,7	0,4	58,1	66,3	452,9	0,0	8,6	218,9	178,0	1,1	36,3	16,6	59,7	60,0	17,8	441,4



Planul decenal de recoltare a masei lemnoase de pe terenurile cu vegetație forestieră

Tabelul 6.2.4.

Tabelul 6.2.4.

Trup pășune

Nr.

Denumire

Nr.

Supr.
ha

Înclinare
grade

Vârsta
ani

Compoziția
%

Consis-
tență
zecimi

Cls. de prod.

Volum + 5 creșteri
mc

Lucrări propuse
Reducerea consistenței
ha

Volum total de extras
mc

1

Alla

1B

1,4

17

60

7CA2JU1ST

0,6

242

4

1C

1,8

10

40

10CA

0,8

273

3

8B

6,3

10

130

10FA

0,2

387

5

8C

27,2

15

130

5GO4FA1CA

0,2

1986

5

6,3

193

193

12C

24,6

15

130

7FA2GO1CA

0,2

1451

5

27,2

993

993

12D

5,9

25

90

6FA3CA1ME

0,7

1352

4

24,6

725

725

13B

11,8

20

60

5CA2FA2GO1ME

0,8

2219

4

13C

6,1

20

110

8FA1GO1CA

0,6

1391

4

13D

3,9

20

120

10FA

0,7

1352

3

14D

3,5

25

30

5CA4FA1JU

1

685

4

15B

19,7

20

90

5FA2GO2CA1ME

0,7

4694

4

16B

6,6

20

110

8FA1GO1CA

0,7

2277

3

16C

15,2

20

40

6CA1FA2ME1SAC

0,8

1843

3

16D

9,0

20

90

7FA2CA1GO

0,7

2773

3

17D

48,7

20

40

4CA3ME1FA1PLT1ANN

0,9

9835

3

18B

60,0

20

40

4ME3CA2ANN1PLT

1

14435

3

19B

49,8

20

30

7CA1FA1ME1SAC

0,9

10336

3

20B

13,0

23

50

4CA2GO2P11FA1ANN

0,8

2811

3

23B

12,5

17

30

7CA1ST1CA1ANN

0,8

2177

4

24B

8,8

20

40

4CA2ME2ANN1FA1PLT

0,9

1902

3

25B

30,4

20

50

4CA2ANN2ME1FA1PLT

0,7

5796

3

25C

9,7

20

50

3CA2ME2ANN1JU1PLT1FA

0,8

2162

3

26B

18,6

20

50

4CA2FA2ANN1JU1ME

0,8

3785

3

27B

33,0

25

60

3CA2FA2ANN1GO1ME1PLT

0,8

6263

4

28B

15,0

25

60

5CA2FA1GO1ME1ANN

0,8

2652

4

29B

22,6

25

60

3CA2FA2ME1ANN1GO1PLT

0,8

4264

4

36B

21,0

20

50

6ANN2CA1SAP1JU

0,8

3748

4

38B

16,9

25

35

4CA2GO2ME1JU1FA

0,9

2265

4

44B

3,5

20

40

10SC

0,7

532

3

46C

0,5

25

20

10SC

0,8

71

3

49B

1,5

3

50

10SA

0,3

90

4

49C

1,1

15

80

6CA4JU

0,5

151

4

1,5

59

59

49D

1,7

15

100

7CA2GO1JU

0,5

251

4

49E

2,1

15

140

8CA2GO

0,5

315

4

49H

0,4

20

140

10GO

0,3

31

4

-

513,8

-

-

-

-

-

-

Total Tr. 1

5,4

20

120

9FA1ME

0,6

96797

4

59,6

1970

1970

Dealul lui Matei

5,4

-

-

-

-

1255

-

Total Tr. 3

5,4

-

-

-

-

1255

-

TOTAL GENERAL

-

519,2

-

-

-

98052

-

59,6

2696

1970



6.2.5. Descrierea lucrării

6.2.5.1. Tăieri de reducere a consistenței

Această lucrare se va efectua pe terenurile în care vegetația forestieră are consistența 0,2 - 0,3 (cu excepția celor cu funcții de protecție), pe o suprafață de 59,6 ha și unde înclinarea terenului permite acest lucru. Astfel, în arboretele cu consistență 0,3 și în care înclinarea terenului este până la 20°, reducerea consistenței se va face până la 0,1.

În arboretul din u.a. 49 H, în suprafață de 0,4 ha, reprezentat de un gorunet cu vârsta de 140 ani și consistență de 0,3, nu se vor executa tăieri de reducere a consistenței dat fiind faptul că arboretul are funcția de protecție a apelor.

Prin tăierile de reducere a consistenței va rezulta un volum de 1970 mc, ceea ce înseamnă 197 mc/an. Lemnul rezultat este de slabă calitate de aceea recomandăm ca el să fie folosit mai mult ca lemn de foc pentru comunitate. Prin efectuarea acestei lucrări, suprafața pășunabilă va crește, favorizând practicarea unui pășunat intensiv și crearea aceluiași ambient necesar animalelor pe pășune.

Recapitulativ planului decenal pe natură de tăieri

Tabelul 6.2.5.1.

Nr. crt.	Denumirea lucrării	Suprafața totală ha	Volum total mc	Suprafața anuală ha	Volum anual mc	Volum pe specii - mc			
						FA	GO	CA	SA
1	Reducere a consistenței	59,6	1970	6,0	197	110	64	17	6
TOTAL		59,6	1970	6,0	197	110	64	17	6

Așa cum se vede din acest tabel, în deceniu se va recolta un volum total de 1970 mc, adică 2% din volumul total al arboretelor (98052 mc), prin tăieri de reducere a consistenței.

6.2.5.2. Lucrări de împădurire

Datorită faptului că proprietarul dorește creșterea suprafeței pășunabile, nu sunt necesare împăduriri.



6.3. PĂȘUNI

6.3.1. LUCRĂRI PRELIMINARE OBLIGATORII DE PUNERE ÎN VALOARE A PAJIȘTILOR

Lucrările tehnice ce urmează a fi executate pe pajiștile în studiu sunt prezentate pe larg în tabelul 6.3.2.2. – "Planul decenal al lucrărilor de pe pășuni". El cuprinde atât lucrări mecanice (scos cioate, defrișarea vegetației arbustive, defrișarea vegetației forestiere < 20 ani, târlire, etc.), cât și lucrări chimice (aplicarea de îngrășăminte, amendamente etc.). De asemenea, se dau indicații asupra dozelor de îngrășăminte și amendamente calcice ce se aplică, norma de semănat și formula floristică pentru reînsămânțări și supraînsămânțări, etc.

Menționăm că soluțiile tehnice și dozele de îngrășăminte chimice, amendamente calcice și semințe de ierburi au fost stabilite împreună cu specialiștii de la I.C.D.P. Brașov, care au participat la întocmirea prezentului amenajament silvopastoral.

La data întocmirii amenajamentului suprafața pășunilor (producătoare de masă verde) este de 2489,0 ha, iar suprafața pășunabilă este de 2008,4 ha. Prin aplicarea unui complex de lucrări (scos cioate, defrișarea vegetației arbustive, defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 ani, combaterea plantelor dăunătoare și toxice), privind mărirea capacității de pășunat se estimează că la sfârșitul deceniului suprafața pășunabilă se va îmbunătăți cu 421,6 ha, ceea ce va însemna un spor important de masă verde.

Aceste lucrări sunt prezentate în tabelul 6.3.2.2. – Planul decenal al lucrărilor de pe pășuni, la nivel de unitate amenajistică cumulate pe trupuri de pășune și sunt următoarele:

6.3.1.1. Îndepărtarea cioatelor și resturilor vegetale

Prin aceste lucrări se vor recupera 5,9 ha de teren pășunabil (u.a. 8B, 8C, 12C, etc), urmând ca după această lucrare să se execute supraînsămânțări cu cel mai potrivit amestec de ierburi.

6.3.1.2. Defrișarea vegetației arbustive și a vegetației forestiere cu vârsta ≤ 20 ani.

Prin această lucrare se va reda circuitului productiv o suprafață de 243,2 ha rezultată prin defrișarea vegetației arbustive și a vegetației forestiere. Când acest tineret se prezintă în grupuri mari, de multe ori cu starea de masiv încheiată, lucrarea se va executa în prima urgență.

În zonele în care, nu există vegetație lemnoasă, este indicat a se păstra mici porțiuni cu regenerare în vederea formării vegetației ambientale (adăpost și protecție pentru animale împotriva intemperiilor și a căldurii) atât de necesară organizării stânelor și a unui pășunat optim. După înlăturarea vegetației lemnoase, porțiunile respective vor fi nivelate și însămânțate cu unul din amestecurile de ierburi prezentate la capitolul 6.5.2.

Materialul care nu prezintă valoare economică sau nu poate fi valorificat sub nici o formă se va arde pe loc spre a se elibera terenul. Arderea se face în mod organizat, materialul fiind așezat în grămezi de formă paralelipipedică, cu dimensiunile 6x2x1,5-2 m înșirate în zigzag pe curba de nivel la o distanță de minim 20 m una de alta.

Materialului destinat arderii, i se va da foc numai pe vreme bună, fără vânt și sub control competent, spre a se evita incendiile. Data efectuării acestei operațiuni se comunică în scris organelor silvice, consiliilor locale și poliției.



În absența lucrărilor anuale de curățiri și în urma folosirii neraționale și în special abandonul sau subîncărcarea cu animale, speciile arbustive se instalează treptat pe pajiști, mărindu-și gradul de acoperire de la un an la altul.

Executarea lucrării de defrișare a vegetației arbustive se poate face atât mecanizat, unde panta terenului permite, cât și manual prin tăiere.

O metoda nouă de combatere, mult mai eficientă, de distrugere a lastărișului și a vegetației arbustive, este aceea a folosirii substanțelor chimice, a arboricidelor. Această metodă o completează și desăvârșește pe cea a tăierii arboretelor cu tulpini a căror grosime este peste 5 cm. Datorită acțiunii fitotoxice selective, substanțele chimice utilizate au distrus arboretele fără a afecta vegetația ierboasă de pe pajiște.

Arboricidele au acționat atât asupra organelor aeriene (lăstari), cât și a celor subterane (rădăcini).

Substanțele chimice folosite ca arboricide nu sunt toxice pentru gramineele perene care alcatuiesc covorul ierbos al pajiștei. Ca măsură preventivă, în timpul aplicării tratamentelor și câteva zile după aceea, este necesar ca pe terenurile respective pășunatul să fie oprit.

6.3.1.3. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor și a rămăturilor de mistreți

Prin executarea acestei lucrări se vor reda circuitului pastoral 103,4 ha. Mușuroaiile în forma actuală sunt înierbate sau acoperite cu mușchi. Distrugerea mușuroaielor și nivelarea terenului se face cu mașini de curățat pajiști sau cu diverse unelte combinate care taie mușuroiul, îl mărunțește și îl împrăștie uniform pe teren. Suprafețele obținute în urma nivelării mușuroaielor vor fi supraînsămânțate cu unul din amestecurile de ierburi prezentate la capitolul 6.5.

6.3.1.4. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice.

Lucrarea se va executa pe o suprafață de 172,5 ha (tab. 6.3.2.2). Dintre plantele dăunătoare și toxice cele mai frecvente sunt: *Carduus nutans*, *Ranunculus carpaticus*, *Cirsium sp.*, *Euphorbia sp.*, *Crocus vernus*, *Dipsacus strigosus*, *Hypericum perforatum etc.* Aceste plante nefiind consumate pot deveni un concurent periculos pentru plantele valoroase. Din acest motiv, se impun măsuri prompte și permanente pentru eliminarea lor.

Cea mai importantă lucrare de combatere o reprezintă cosirea repetată în timpul sezonului de vegetație mai mulți ani la rând. Prin aceasta, buruienile sunt împiedicate să ajungă la maturitate și să se înmulțească, încet-încet ele dispărând din compoziția floristică.

O măsură de prevenire a înmulțirii plantelor dăunătoare și toxice o reprezintă schimbarea permanentă a locului de odihnă a animalelor în scopul evitării apariției buruienilor de pajiște. Pentru combaterea plantelor nedorite se pot folosi și metode chimice, bazate pe aplicarea de erbicide, cum ar fi DICOTEX în doze de 7 l / ha sau ROUND-UP (Glifosat) în doze de 4 - 6 l/ha aplicate primăvara la apariția rozetelor.

Combaterea speciei *Euphorbia cyparissias* (alior) prin metode chimice cu rezultate satisfăcătoare au fost obținute cu doza de 6 kg/ha – 2,4D aplicat în faza de înflorire. La această doză 80% din plantele tinere au fost distruse, fără a diminua producția de furaj.

După aplicare, toate ierbicidele au un efect fitotoxic redus în sol, de aceea supraînsămânțările vor fi efectuate după 2 - 3 săptămâni, iar pășunatul după o lună.

Prin lucrarea de *Combaterea plantelor dăunătoare și toxice*, se vor reda circuitului pastoral 172,5 ha, suprafața obținută fiind supraînsămânțată cu unul din amestecurile de ierburi prezentate la capitolul 6.5.



6.4. METODE DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A COVORULUI IERBOS PRIN FERTILIZARE

Având în vedere că în medie pajiștile analizate au o valoare pastorală bună, în cele ce urmează se prezintă lucrările agrotehnice necesare pentru ameliorarea pășunilor și sporirea producției de masă verde la hectar.

Valoarea pastorală a pajiștilor

Suprafața totală - ha -	Starea actuală – ha				
	Foarte bună	Bună	Mijlocie	Slabă	Foarte slabă
2172,3	55,1	1180,7	898,1	32,6	5,8
% 100	3	54	41	2	-

6.4.1. Târlirea pajiștilor cu animale

Lucrările agrotehnice pentru ameliorarea pășunilor sunt prezentate în tabelul 6.4.2.2. și constau în principal în fertilizări, fie chimice, fie prin târlire cu animale.

În continuare, prezentăm câteva tehnologii de îmbunătățire a pajiștilor cu mijloace de suprafață. Acestea sunt prezentate în ordinea complexității pe tipuri de pajiște.

Târlirea

Tabelul 6.4.1.1.

Nr.	Tipul de pajiște Denumire	Târlire cu animale (nr. nopți)	
		1 oaie /m ²	1 vacă /5m ²
I	Festuca ± Agrostis (0 - 30%)	3 - 4	3 - 4
II	Festuca ± Nardus (30 - 50%)	3 - 4	3 - 4
III	Agrostis ± Calamagrostis ± Deschampsia (0 - 30%)	4 - 5	4 - 5
IV	Arrhenatherum ± Festuca ± Agrostis ± Dactylis (0 - 30%)	2 - 3	2 - 3
V	Trifolium (>50%)	2 - 3	2 - 3
VI	Deschampsia (>50%)	5 - 6	5 - 6
VII	Calamagrostis (>50%)	5 - 6	5 - 6

6.4.2. Fertilizarea cu gunoi de grajd și alte îngrășăminte organice

Prima și cea mai importantă resursă de fertilizanti pentru pajiști o constituie îngrășămintele organice (gunoi de grajd, compost, turbureală, urină, etc.). Un caz aparte îl constituie târlirea cu animale în perioada de pășunat, care este cea mai ieftină metodă de fertilizare.

Gunoiul de grajd este un îngrășământ organic complet, conținând toate elementele nutritive necesare plantei. Reprezintă, de asemenea, unul dintre cele mai importante produse organice naturale care poate fi folosit în stare proaspătă, parțial sau complet fermentat, cu o valoare ridicată de fertilizare pe unitatea de volum. Dacă acesta este bogat în nutrienți, atunci pentru producătorii agricoli devine rentabilă stocarea și utilizarea lui în locul îngrășămintelor minerale, care sunt mai puțin accesibile din cauza prețurilor ridicate. Pentru a putea calcula dacă ați aplicat o cantitate corespunzătoare cu cerințele impuse de acest pachet vă prezentăm în tabelul următor compoziția chimică a gunoiului de grajd de diferite proveniențe:



Tabelul 6.4.2.1.

Tipul de gunoi	Compoziția chimică (%din masa proaspătă)			Tone maxime aplicabile pe hectar pentru limita de 30 kg N s.a./ha
	Azot (N)	Apă	Materii organice	
Gunoii de cabaline	0,58	71	25	5,16
Gunoii de bovine	0,45	77	20	6,67
Gunoii de ovine	0,83	64	31	3,60
Gunoii fermentat 3-4 luni	0,55	77	17	5,45
Gunoii fermentat complet (mranită)	0,98	79	14	3,0

Exemplu: fiecare 1000 Kg gunoii fermentat, conține aproximativ 5 Kg N s.a.

6.4.3. Fertilizarea pajiștilor cu îngrășăminte chimice

Datorită resurselor insuficiente de îngrășăminte organice pentru îmbunătățirea pajiștilor și a caracteristicilor pe care le au, respectiv conținut redus de elemente fertilizante în cantități mari de material (gunoii, compost, turbureală, etc.) care măresc cheltuielile de transport și aplicare, suntem nevoiți să facem adesea apel la îngrășămintele chimice mai ușor de administrat la distanțe mari de fermă în condiții naturale mai greu accesibile.

Folosirea îngrășămintelor chimice pe pajiști a produs o adevărată revoluție verde prin sporuri mari de producție de iarbă și calitatea furajelor, reflectate și în creșterea numărului de animale și al producțiilor acestora la unitatea de suprafață din fermele zootehnice.

Aplicarea îndelungată și în cantități mari a îngrășămintelor chimice pot avea și efecte negative cum ar fi acidifierea solului, poluarea mediului cu nitriți și nitrați, perturbarea activității microorganismelor din sol, dezechilibre de nutriție la animale, reducerea biodiversității și altele.

Administrarea în doze moderate și echilibrate a îngrășămintelor chimice pe pajiști în funcție de caracteristicile agrochimice ale solului, nivelul de producție și modul de folosință preconizat este una din cele mai importante pârghii de sporire a productivității pajiștilor permanente (seminaturale și naturale) și temporare (semămate).

Principalele roci și substanțe cu care se amendează pajiștile pentru corectarea acidității sunt: carbonatul de calciu (CaCO_3), praful de var (CaO), praful de var stins ($\text{Ca}(\text{OH})_2$), spuma de dejecție de la fabricile de zahăr și reziduurile cu calciu de la fabricile de îngrășăminte chimice. Dozele recomandate pentru pajiști sunt de 5 - 7 t/ha CaCO_3 (3 - 4 t/ha CaO) aplicate odată la 10 - 12 ani, revenind în medie cca. 500 kg/an.

6.4.3.1. Doze de îngrășăminte chimice și fracționarea lor

În general, pentru fiecare tip de pajiște permanentă (naturală sau seminaturală) pe baza rezultatelor experimentale din țara noastră au fost stabilite doze de îngrășăminte chimice.

Raportul optim între elementele fertilizante (nutritive) NPK pentru condițiile din țara noastră în cazul pajiștilor permanente este de 2 - 1 - 1, adică la două părți azot (N) revine o parte fosfor sub formă de pentaoxid de fosfor și o parte potasiu sub formă de oxid de potasiu.

Conform buletinelor de analiză, a solurilor identificate pe pășunile analizate, aprovizionarea în azot total este de la moderat, la bine aprovizionată (0,165-0,336%), în fosfor mobil este de la moderat, la bine aprovizionat (27,5 - 51,8 ppm), iar în potasiu este slab la foarte bine aprovizionate (46,0-224,0 ppm).

În funcție de tipul de pajiște și de cantitățile de elemente nutritive din sol se vor aplica îngrășăminte chimice conform schemelor de mai jos.



Pe pajiștile supraînsămânțate doza de azot (N) poate crește până la 50% față de pajiștea permanentă, la același nivel de PK. Pentru pajiștile temporare (semănate) dominate de graminee (>70%) doza de N poate crește cu 50 – 100% față de cele permanente aflate în aceleași condiții naturale, astfel că raportul poate fi de la 3 – 1 – 1 până la 4 – 1 – 1 în caz de intensivizare a producției.

Pe pajiștile bogate în leguminoase (>50%) doza de azot (N) se reduce cu 50%, respectiv la jumătate, astfel că raportul azot, fosfor, potasiu (NPK) poate fi de 1 – 1 – 1 până la 0 – 1 – 1, azotul fiind asigurat prin fixare simbiotică.

6.4.3.2. Fraționarea dozelor de azot

Îngrășămintele azotate se aplică fracționat în funcție de modul de folosință. În regim de fânează pe pajiștile permanente dozele de azot se aplică în două fracții, de regulă prima de 2/3 și a doua de 1/3 din total în zone mai secetoase și munți mijlocii, respectiv în două părți egale în zone mai favorabile din zona de dealuri umede și premontană. În regim de pășunat pe pajiștile permanente și temporare pentru eşalonarea producției, dozele se aplică în mai multe fracții egale în funcție de numărul ciclurilor de recolta în doze de câte 30 azot până la 50 azot kg/ha primăvara devreme și după fiecare ciclu, exceptând pe ultimul.

Pe pășunile studiate, după analizele de sol efectuate, a rezultat că solurile sunt, în cea mai mare parte mijlociu la bine aprovizionate cu azot.

6.4.3.3. Aplicarea fosforului și potasiului


Îngrășămintele fosforice și potasice se aplică, pe pajiști, de regulă toamna, cu excepția situațiilor când folosim îngrășăminte chimice complexe de azot, fosfor și potasiu, când se aplică concomitent cu azotul primăvara. Aplicarea unilaterală a azotului a dus la scăderea rezervei de fosfor și potasiu din sol, de aceea aplicarea acestor elemente deficitare care produc carențe în furaje, este în prezent obligatorie.

În funcție de deficitul de fosfor din sol se poate mări doza de fosfor, mergând până la dublarea ei. Din buletinul de analize, se poate observa, că în cele mai multe situații, cantitatea de fosfor mobil este moderat la bine aprovizionat, ceea ce înseamnă că solurile analizate nu necesită aplicarea de îngrășăminte pe bază de fosfor.

În ceea ce privește potasiul, solurile pășunii analizate sunt slab la foarte bine aprovizionate, așa încât aplicarea îngrășămintelor se va face diferențiat pe fiecare unitate în parte, în funcție de cantitatea necesară de potasiu.



Un exemplu de fertilizare

Aplicăm primăvara devreme îngrășăminte chimice complexe din formula 15 – 15 – 15, o cantitate de 330 kg/ ha produs comercial pentru asigurarea unui nivel de 50 kg/ha N și aceeași cantitate de oxizi de P și K necesare pentru întreg anul, după care în completare, imediat sau după ciclurile de recoltă se aplică numai îngrășăminte azotoase cum ar fi nitrocalcarul (21 % N) pe solurile acide, azotatul de amoniu (33,5 % N) sau ureea (46 N) pe soluri cu reacție normală și sulfatul de amoniu (20 % N) pe soluri sărăturate.



Dacă proprietarul sau beneficiarii pajiștilor analizate pe suprafețele eligibile APIA accesează pachetul 1 „Pajiști cu Înaltă Valoare Naturală” și pachetul 2 „Practici agricole tradiționale” este interzis folosirea fertilizanților chimici, datele prezentate mai sus fiind doar orientative.

Schemele tehnologice amintite în acest capitol se prezintă astfel:



Planul decenal al lucrărilor de pe pășuni

Tabel 6.4.2.2


Tabel 6.4.2.2

Trup pășune		U.a.									
Nr.	Denumire.	Nr.	Supr.	Scos cioate	Distrugea și nivelarea musuroaielor și a ramaturilor de mistreț	Defrișarea vegetației arbusive	Defrișare vegetației forestiere ≤ 20 ani	Combat plante dăunătoare și toxice	Supraînsămânțări	Reînsămânțări	Fertilizări
1	Alia	1A	5,9			0,1		0,2	0,3		5,9
		1D	18,3					1,5	1,5		18,3
		2	56,7		1,1	1,7	1,1	2,2	6,1		56,7
		4	75,2		1,2	2,2		5,3	8,7		75,2
		5A	24,5					1,2	1,2		24,5
		5B	30,6			0,9		3,7	4,6		30,6
		6A	40,2			0,4		2,0	2,4		40,2
		6B	5,0			0,3		0,5	0,8		5,0
		7	20,2		6,1	1,0			7,1		20,2
		8A	17,0		0,9	0,2		0,9	2,0		17,0
		8B	6,3	0,6				0,4	1,0		6,3
		8C	27,2	2,7				1,6	13,0		27,2
		9	31,6		1,9	1,4	5,4	1,6	3,8		31,6
		10	25,7		1,3	0,9		1,5	9,3		25,7
		11	42,5		3,9	2,6	1,3	2,1	2,5		42,5
		12A	19,8		0,4	0,4		1,4	3,8		19,8
		12B	21,3		2,0	0,6		1,1	3,2		21,3
		12C	24,6	2,5	1,5	1,2	0,2	4,4	3,9		24,6
		13A	54,6		1,6	16,4	2,7	0,8	7,3		54,6
		14A	16,3			5,7	0,8	1,1	1,1		16,3
		14B	21,7					0,5	0,5		21,7
		14C	9,2					3,3	15,2		9,2
		15A	47,5		2,4	9,5		4,3	12,4		47,5
		16A	53,5			5,4	2,7	2,2	2,6		53,5
		17A	14,9	0,1		0,3		0,2	0,5		14,9
		17B	5,1		0,3			1,5	11,2		5,1
		17C	19,3			3,9	5,8	0,4	1,0		19,3
		18A	12,3					1,3	4,2		12,3
		19A	19,1		0,6	2,9		3,4	16,0		19,1
		20A	41,9			8,4	4,2	5,7	32,3		41,9
		21	56,7			25,5		4,2	17,3		56,7
		22	52,3		1,1	10,5		5,3	9,1		52,3
		23A	59,5		2,6	6,0		4,8	16,4		59,5
		24A	43,4		6,0	4,3		8,0	21,3		43,4
		25A	46,6			11,7		4,7	14,7		46,6
		26A	66,4			10,0		3,2	3,2		66,4
		27A	66,9		3,3	3,3		1,1	4,1		66,9
		28A	26,7		6,7		1,1	1,4	2,4		26,7
		29A	37,4		1,9	1,0					37,4
		30	20,5								20,5



-Continuare-

Trup pășune		U.a.		Nr.	Denumire.	Scos cioate	Distrușirea și nivelarea musuroaielelor și a ramaturilor de mistret	Defrișarea vegetației arborescente	Defrișare vegetației forestiere ≤ 20 ani	Combat plante dăunătoare	Supraînsămânțări	Reînsămânțări	Fertilizări
Nr.													
				31				4,4		1,7	6,1		43,6
				32			4,6	3,7		3,7	12,0		46,4
				33			2,7	5,3		3,7	11,7		53,4
				36A			5,3	8,0	2,7	4,3	20,3		53,2
				37				18,9		4,7	23,6		94,6
				38A			4,6	9,3		4,6	18,5		46,3
				39				3,5		2,5	6,0		35,0
				40						2,8	2,8		55,1
				41				2,1	1,4	5,0	8,5		71,3
				42				0,7		5,4	6,1		67,5
				43						3,1	3,1		52,3
				44A			1,6			5,7	7,3		82,0
				45						1,2	1,2		39,6
				46A			0,9	0,9	0,9	3,9	6,6		96,9
				46B				0,2		0,6	0,8		7,8
				47			8,3	4,2		8,3	20,8		83,0
				48A				0,1		0,1	0,2		0,9
				48B			0,2			0,9	1,1		11,8
				49A			0,1			0,2	0,3		3,5
				49B			0,1	0,3	0,5	0,1	1,0		1,5
				49F					0,2		0,2		0,3
				49G			0,2	1,8		2,7	4,7		17,8
				49H				0,2	0,1		0,3		0,4
				49I									
				Total			18,2	202,3	31,1	158,9	473,6	18,2	2266,8
2				Alta Mare		5,9	33,6			1,4	3,7	18,2	46,0
				Total			2,3			1,4	3,7		46,0
3				Dealul lui Matei			2,3			7,2	13,9		65,7
				34A			6,7			0,6	6,1		12,1
				34B			0,1			0,6	0,6		6,7
				Total			6,8			7,8	20,0		77,8
4				Dealul Belin		0,0	0,0			2,2	6,4		27,9
				50A			0,1			0,3	0,6		11,2
				50B			0,1			0,1	0,2		3,5
				51			0,1			0,1	1,3		33,8
				52			0,2			0,8	1,0		2,0
				Total		0,0	0,7	0,2	0,0	2,2	3,1	0,0	50,5
5				Lângă Olt		5,9	103,4	204,5	38,7	172,5	506,8	18,2	2469,0
				Total general									





6.5. METODE DE ÎMBUNĂȚĂȚIRE PRIN SUPRAÎNSĂMÂNȚARE SAU REÎNSĂMÂNȚARE A PAJIȘTILOR DEGRADATE

6.5.1. Principii de refacere parțială a covorului ierbos

Pajiștile care au o acoperire de peste 60-70% cu specii nevaloroase pentru furaj și care reclamă înlocuirea totală a covorului ierbos, se recomandă a fi *reînsămânțate*.

Pentru refacerea parțială a unei pajiști trebuie să existe în covorul ierbos specii furajere valoroase pe 30 – 50%, care necesită să fie completate prin *supraînsămânțare* cu alte specii valoroase. De regulă, acestea se execută după defrișarea vegetației arbustive, forestiere și alte măsuri preliminare care să faciliteze mecanizarea lucrărilor de întreținere și folosire a pajiștilor în anii următori.

O situație aparte o constituie pajiștile cu covor ierbos valoros, dar cu o densitate scăzută care necesită a fi îndesit prin *autoînsămânțare*. În acest caz, odată la 4 – 6 ani prin rotație, se recoltează prin cosire covorul ierbos mai târziu, după coacerea și scuturarea semințelor care cad pe sol, încolțesc și înlocuiesc plantele care au îmbătrânit și în cele din urmă au pierit, lăsând goluri care trebuie completate.

În acest caz înlocuirea covorului ierbos se face de la sine prin procesul de autoînsămânțare, acesta fiind unul din cele mai eficiente mijloace de îmbunătățire a densității pajiștilor, cu condiția ca plantele componente să aibă valoare furajeră corespunzătoare. Dacă avem un covor ierbos îmburuieat nu putem apela la autoînsămânțare întrucât am stimula și mai mult extinderea buruienilor nedorite.

Lucrări de supraînsămânțare se vor executa pe o suprafață de 506,8 ha în unitățile amenajistice prezentate în tabelul 6.4.2.2. Ele vor fi făcute în toate pajiștile în care se execută lucrări de recuperare și îmbunătățire a suprafețelor de pășune (defrișarea vegetației arbustive și forestiere cu vârsta ≤ 20 ani, combaterea plantelor dăunătoare și toxice).

Lucrări de reînsămânțare se vor executa pe o suprafață de 18,2 ha în unitatea amenajistică 49 I în care la momentul actual există *Deschampsia caespitosa*. În această unitate se recomandă înlocuirea tipului de pajiște existente cu amestecuri de ierburi prezentate la subcapitolul următor

Pentru supraînsămânțări și reînsămânțări se recomandă rețetele prezentate în următorul subcapitol.

6.5.2. Amestecuri de ierburi

După stabilirea metodei de refacere totală sau parțială a covorului ierbos, pasul următor este stabilirea unui amestec de graminee și leguminoase perene de pajiști, care implică un minim de informații despre aceste specii.

Cu ocazia lucrărilor de supraînsămânțări prevăzute a se executa pe 506,8 ha și a lucrărilor de reînsămânțare prevăzute pe 18,2 ha, se vor folosi amestecuri de ierburi din speciile și cantitățile indicate mai jos:

Amestec de ierburi recomandate:

- <i>Festuca pratensis</i> (păiuș de livadă).....	12kg /ha
- <i>Lolium perenne</i> (raigraș peren).....	6kg /ha
- <i>Phleum pratensis</i> (timoftica).....	4kg /ha
- <i>Festuca rubra</i> (păiuș roșu).....	2kg /ha
- <i>Poa pratensis</i> (firuță).....	2kg /ha
- <i>Lotus corniculatus</i> (ghizdei).....	2kg /ha
- <i>Trifolium repens</i> (trifoi alb).....	2kg /ha
- <i>Dactylis glomerata</i> (golomăt).....	2kg /ha
Total	32kg /ha



În continuare prezentăm câteva specii din amestecurile folosite pentru reînsămânțări și supraînsămânțări.

Festuca pratensis (păiuș de livadă)



Plantă perenă cu tufă rară, tulpini arcuit – ascendente, cilindrice, protejate la bază de teci de culoare violacee. Frunzele sunt plane, liniar-lanceolate, cu limbul glabru, lucios pe partea inferioară. Paniculul are 8 – 15 cm, cu spiculețe scurt pedunculate.

Capacitatea de producție este de 10 – 13 t/ha SU, cu un conținut de proteină relativ ridicat, între 11 – 15% în funcție de fenofaza de recoltare și un coeficient de digestibilitate mare (63 – 67%). Datorită faptului că foliajul este bogat și finețea frunzelor este mare, acestea oferă furajului o valoare nutritivă ridicată.

Se dezvoltă cel mai bine pe soluri argiloase, grele, bogate în substanțe nutritive, pe soluri argilo-iluviale din lunci, dar și pe luvosoluri.

Aria de cultură este zona silvostepii, până în etajul pădurilor de molid. Reacția atât la îngrășămintele minerală cât și cele organice este foarte bună.

Lolium perenne (raigras peren)



Graminee de talie mică, cu tufă rară, cu rizom scurt, și numeroși lăstari de culoare violacee la bază.


Frunzele plane, lucioase, și de culoare verde intens pe partea dorsală, și verde - gălbui și fără luciu, pe partea ventrală. Inflorescența este spic compus.

Producția de substanță uscată ce poate fi obținută în condiții optime, este cuprinsă între 8 – 12 t/ha. Din punct de vedere a compoziției chimice calitatea furajului este bună, având un conținut de proteină brută cuprins între 14 – 17% și de 24 – 28% celuloză brută. S-a constatat că planta are un conținut ridicat de glucide solubile. Este o specie tipică pentru pășunat, deoarece rezistă la călcat și are o bună regenerare după ce a fost exploatată.

Se găsește spontan sau cultivată în pajiști din luncile râurilor, pe soluri fertile, cu aport freatic.

În regiunile montane, urcă până la 1300 – 1400 m altitudine (Burcea P., 2006). Temperatura optimă de dezvoltare este de 18 – 20° C.

Preferă zonele cu ierni blânde și zăpadă puțină și este sensibilă la ger uscat și veri secetoase. În ceea ce privește solul, le preferă pe cele argiloase, bogate în nutrienți și substanțe minerale.



***Phleum pratensis* (timoftica)**



Este plantă perenă, cu tufă rară, înaltă de până la 1,5 m. Sistemul radicular este superficial, tulpinile sunt elastice. Frunzele sunt fără păr, laminate, la bază maro închis, de până la 15 cm lungime și jumătate de cm lățime. Inflorescența este un panicul spiciform, de o lungime de 6 – 8 cm.

Este o specie furajeră foarte productivă, dar 50% din producție se realizează la prima cosire sau ciclu de pășunat. Producția de substanță uscată ce poate fi obținută este de 9 – 12 t/ha. Referitor compoziția chimică, planta are un conținut în proteină brută cuprins între 10 – 12% și un coeficient de digestibilitate relativ bun (58 – 60%).

Are cerințe mari pentru umiditate și moderate pentru căldură și substanțe nutritive. Valorifică bine solurile grele, turboase și pe cel slab până la moderat acide.

***Festuca rubra* (păiuș roșu)**



Este o plantă de talie mijlocie (30 – 90 cm), cu înfrățire mixtă, ritm lent de dezvoltare. Frunzele bazale sunt filiforme, iar cele tulpinale sunt îngust-liniare. Inflorescența este mai mică decât la *F. pratensis* și are spiculețe mici și aristate.

Din punct de vedere furajer, valoarea sa este potențată de structura amestecurilor de specii perene cu care se cultivă pentru formarea de pajiști de lungă durată. În ceea ce privește compoziția chimică la specia *Festuca rubra*, proteina brută reprezintă 9 – 11% din SU, celuloza brută 28 – 30%, iar digestibilitatea înregistrează un coeficient de 60 – 65% din SU. Producția de substanță uscată ce poate fi obținută dacă este exploatată în condiții optime este de 8 – 10 t/ha. Este des întâlnită de la 300 m altitudine până la 1500 m.

Are o rezistență bună la ger și înghețurile târzii de primăvară. Crește pe o gamă mare de soluri nefiind pretențioasă nici la sol, nici la umiditate și răspunde bine la fertilizarea prin târlire. Se pretează foarte bine la pășunat, deși otăvește relativ încet. Se recomandă pentru ameliorarea pajiștilor permanente degradate, prin lucrări de supraînsămânțare.

***Lotus corniculatus* (ghizdei)**



Plantă perenă cu tulpini simple sau ramificate, glabre sau păroase, crește în tufe cu numeroși lăstari ascendenți, des, foliari, iar florile sunt galbene, mai rar roșii-portocalii, scurt pedunculate, dispuse în umbеле simple. Păstaia este polispermă, dreaptă, cilindrică, dehiscentă, de culoare brun roșietică la maturitate.

Este răspândită pe pajiștile din câmpie și până pe cele din etajul montan inferior, pe soluri cu fertilitate redusă, acide, cu precădere pe soluri podzolice. Planta este valoroasă din punct de vedere furajer, având însă un grad redus de consumabilitate în verde, datorită gustului amărui. (imprimat de un glicozid). Ghizdeiul produce un furaj bogat în proteine, cu o valoare nutritivă ridicată, dar mai scăzută decât la lucernă, trifoi și sparceta și conține circa 13 – 14% proteină brută, 22 – 31% celuloză brută, în funcție de faza de recoltare și cantități apreciable de Ca și Mg.

Producția de substanță uscată este de 8 – 9 t/ha. Este recomandat pentru folosirea în ameliorarea pajiștilor permanente (prin supraînsămânțare) sau la înființarea pajiștilor semănate.

Pentru înființarea celor semănate se recomandă amestecurile simple cu diferite graminee perene (păiuș de livezi, raigras peren, păiuș înalt) sau amestecurile complexe destinate pentru valorificarea mixtă. Având în vedere amplitudinea ecologică mare pe care o are această specie se recomandă zonele în care lucerna și trifoiul roșu dau rezultate mai slabe.

***Trifolium repens* (trifoi alb).**



Trifoiul alb este o plantă mică, perenă, erbacee, glabră, cu tulpina culcată la pământ, din care pornesc rădăcini. Frunzele sunt trifoliolate, adeseori pătate cu alb sau o pată mai închisă, dispuse pe un pețiol lung. Pe tulpină, la baza pețiolului, se găsesc stipele membranoase, ascuțite la vârf, albe-gălbui, cu nervuri verzi și liliachii. Florile sunt de culoare albă sau ușor roze, pe măsură înfloririi ele se brunifică și sunt dispuse în capitule globuloase, așezate la vârful unor pedunculi drepți, mai lungi decât frunzele. Înfloarește în luna mai, până în septembrie.

Este leguminoasa de pajiște cu cea mai mare arie de cultură, din câmpie până în etajul pădurilor de molid exceptând zonele prea uscate din cauza sensibilității la secetă. Este nepretențios față de sol, suportând și soluri mai grele, sărace, neutre, sau ușor acide.

Preferă solurile bogate în fosfor și potasiu, fixează în sol cantități mari de azot cu ajutorul bacteriilor din nodozitățile de pe rădăcini. Produce până la 8 – 9 t/ha SU, calitatea furajului fiind foarte bună, cu următorii indici 20 – 22% proteină brută, 19 – 21% fibră brută, și un coeficient de digestibilitate mare de 65 – 70%. Poate fi folosită pentru pășune și mixt.

***Dactylis glomerata* (golomăt)**



Plantă perenă, cu tufă rară, de talie înaltă, cu lăstari erecti sau ușor ascendenți, cu baza comprimată protejată cu teci netede, închise, cele din treimea superioară deschise. Inflorescența este un panicul cu ramuri solitare și ramificații secundare scurte, având în vârful lor spiculețe multiflore strânse în glomerule.

Suportă seceta, este mijlociu rezistentă la iernare, dar sensibilă la oscilații de temperatură primăvara. Nu suportă excesul de umiditate, și este destul de sensibil la rugina galbenă. Reacționează bine la fertilizare pe bază de azot.

În condiții optime se pot produce 10 – 14 t/ha SU, cu un conținut în proteină de 13 – 16,5 % și coeficienți de digestibilitate cuprinși între 60 – 62%.

Este recomandat a se folosi în alcătuirea amestecurilor simple și complexe de graminee și leguminoase perene atât pentru pășune cât și pentru fâneată, având o capacitate de competiție ridicată. Un furaj de excelentă calitate rezultă dacă specia este folosită în amestec cu lucernă. După apariția inflorescențelor, calitatea golomătului scade, de aceea se recomandă recoltatul pentru fân, imediat după înspicare, iar silozul de golomăt este de cea mai bună calitate.

6.5.3. Supraînsămânțarea pajiștilor

Prin supraînsămânțarea unei pajiști se introduc în compoziția floristică unele specii sau soiuri de leguminoase și graminee perene bianuale sau anuale valoroase pentru asigurarea unei densități și proporții optime în scopul sporirii producției și calității futajelor.

Din punct de vedere al suprafeței pe care se execută, se distinge o supraînsămânțare locală (parțială) care se execută manual pe locurile unde s-a defrișat vegetația arbustivă și forestieră, s-a nivelat terenul, etc.

După supraînsămânțarea cu amestecuri de ierburi propuse de prezentul studiu se urmărește pe lângă redarea în circuitul pastoral a unor importante suprafețe de pajiște și restaurarea ecologică a vegetației secundare valoroase în vederea practicării unei zootehnii intensive și raționale.

6.6. FOLOSIREA PAJIȘTILOR

După aplicarea metodelor de îmbunătățire a pajiștilor permanente în continuare se va acorda o atenție la fel de mare folosirii producției de iarbă, atât prin pășunat direct cu animalele, cât și prin cosire în vederea conservării ei pentru sezonul rece sub formă de fân, siloz, etc. sau a utilizării masei verzi pentru furajare la iese.

6.6.1. Determinarea valorii pastorale

Valoarea pastorală este un indice sintetic de caracterizare a calității unei pajiști, determinată prin metode floristice de apreciere. Compoziția floristică a pajiștilor analizate a fost determinată prin metoda pratologică, care pune accent pe aprecierea participării procentuale în biomasă a componentelor botanice pe grupe economice, (graminee, leguminoase, ciperacee și juncacee, alte familii, mușchi și licheni, specii lemnoase), fiind cea mai recomandată metodă rapidă pentru determinarea valorii pastorale.



6.6.2. Stabilirea încărcării cu animale

Ritmul neuniform de repartizare a producției de iarbă pe pășuni face ca animalele să aibă, de regulă, un surplus de hrană la începutul pășunatului și să fie în criză la sfârșitul sezonului.

Rezolvarea acestui neajuns pe pășunile neamenajate se face pe două căi și anume: reducerea treptată a efectivelor de animale scoase la pășunat sau hrănirea cu nutrețuri produse în arabil (porumb verde, sfeclă, dovlecei, etc.) sau alte furaje însilozate.

În condițiile unui pășunat pe tarlale, această problemă se poate rezolva mult mai ușor în sensul că o parte din tarlale (de exemplu 2 – 3 tarlale din 8 existente) la primul ciclu de pășunat producția excedentară se cosește pentru prepararea fânului sau însilozare. La fel se procedează și la ciclul doi de pășunat (1 – 2 tarlale din 8).

Abia la ciclul al 3-lea și următoarele (4 – 6), producția pășunii se valorifică numai prin păscut cu animalele și completarea după caz pentru vacile de lapte cu furaje recoltate din primele cicluri de recoltă sau din afara pășunii.

Stabilirea încărcării cu animale a unei pășuni se face în baza determinării repetate în mai mulți ani a producției pășunii prin cosire, respectiv a producției totale de iarbă pe cicluri de pășunat cât și stabilirea coeficientului de folosire a ierbii.

Producția totală de iarbă se determină prin cosire și cântărire pe 2 - 4 mp din tarla ce urmează să fie pășunată sau pe o suprafață de probă îngrădită.

Coeficientul de folosire exprimat în procente se stabilește prin cosirea și cântărirea resturilor neconsumate pe 5 – 10 mp, după scoaterea animalelor din tarla și raportarea ei la producția totală.

Pe pășuni se calculează încărcarea posibilă cu animalele în funcție de nivelul de fertilizare a pajiștii, durata de pășunat și alte criterii.

Capacitatea actuală de pășunat se va calcula pe tipurile tehnologice stabilite la capitolul 4.3.

- I. *Festuca* ± *Agrostis* (0 - 30%)
- II. *Festuca* ± *Nardus* (30 – 50%)
- III. *Agrostis* ± *Calamagrostis* ± *Deschampsia* (0 - 30%)
- IV. *Arrhenatherum* ± *Festuca* ± *Agrostis* ± *Dactylis* (0 - 30%)
- V. *Trifolium* (>50%)
- VI. *Deschampsia* (>50%)
- VII. *Calamagrostis* (>50%)

Capacitatea actuală de pășunat

Tabelul 6.3.2.3.

Tip de pajiște	Suprafața ha	Producția de masă verde t / ha	Coeficient de consumabilitate %	Producția de M.V. utilă t / ha	Producția totală M.V.-tone	Încărcare U.V.M.	
						1 ha	Total
I	979,9	8-10	80	7,2	7055,3	0,74	724
II	65,8	3-5	50	2	131,6	0,21	13
III	162,5	6-8	65	4,5	731,3	0,46	75
IV	937	10-15	90	10,8	10119,6	1,11	1038
V	3,5	30-50	90	36	126,0	3,69	13
VI	18,2	1-10	20	1	18,2	0,10	2
VII	5,4	30-50	20	8	43,2	0,82	4
Total	2172,3	10,0	81	8,4	18247,3	0,86	1872

Din acest tabel se observă că la ora actuală pentru suprafața totală a pășunilor de 2172,3 ha încărcarea este de 0,86 U.V.M. /ha, adică 1872 U.V.M. pentru întreaga suprafață pășunabilă.

Pentru pajiștile din tipurile I, II, IV și V tehnologic, calitatea furajeră (producția de masă verde), valoarea pastoral și gradul de consumabilitate sunt la un nivel optim. Nu



putem spune același lucru și despre tipurile III, VI și VII tehnologic, în alcătuirea cărora pajiștile sunt invadate de *Calamagrostis epigeios* și *Deschampsia caespitosa*.

În urma aplicării măsurilor de refacere propuse prin prezentul studiu, suprafața covorului ierbos va crește cu 249,1 ha (recuperată prin lucrări de defrișarea vegetației arbustive și forestiere, scos cioate) și se va îmbunătăți pe 275,9 ha, prin combaterea plantelor dăunătoare și toxice, distrugerea și nivelarea mușuroaielor și a rămăturilor de mistreț.

În urma aplicării măsurilor de îmbunătățire propuse prin prezentul studiu în următorii 5-10 ani se va ameliora atât compoziția floristică a pajiștilor cât și producția de masă verde la hectar, care va ajunge la 12 - 15 t. Prin creșterea coeficientului de consumabilitate la 85%, se va mări producția utilă de la 8,4 t / ha cât este în prezent la 11,0 t / ha.

În final, se va ajunge la o încărcare medie de 1,12 U.V.M. / ha, ceea ce înseamnă 2451 U.V.M. pentru întreaga suprafață pășunabilă, mai mare decât în prezent cu 30%.

Coeficienții de conversie a animalelor erbivore în UVM

Tabelul 6.3.2.4.

Categoria de animale	Coeficientul de transformare în UVM	Nr. capete/ 1 UVM
Tauri și boi de muncă	1,0 – 1,2	0,8 – 1,0
Vaci de lapte	1,0	1,0
Bovine de toate vârstele (în medie)	0,7 – 0,8	1,3 – 1,4
Tineret bovin peste 1 an	0,5 – 0,7	1,4 – 2,0
Tineret bovin sub 1 an	0,2 – 0,3	3,3 – 5,0
Oi și capre de toate vârstele	0,14	7,1
Oi și capre mature	0,15 – 0,16	6,3 – 6,7
Cai de toate vârstele	0,8	1,3
Cai de tracțiune	1,0 – 1,1	0,9 – 1,0
Tineret cabalin peste 1 an	0,5 – 0,7	1,4 – 2,0
Tineret cabalin sub 1 an	0,2 – 0,3	3,3 – 5,0

6.7. CONSTRUCȚII ȘI DOTĂRI ZOOPASTORALE

Pentru buna funcționare a pășunilor analizate sunt necesare mai multe construcții și dotări pentru sporirea gradului de accesibilitate, îmbunătățirea alimentării cu apă, adăpostirea oamenilor și animalelor, prelucrarea laptelui, energie electrică, împrejmuire pentru târlire și pășunat rațional, depozitarea și aplicarea dejecțiilor cât și alte utilități în consens cu dezvoltarea tehnicii și nivelului de civilizație.


6.7.1. Drumuri și poteci de acces

În vederea gospodăririi intensive și raționale a pajiștilor, căile de acces au o importanță deosebită. Pentru pășunea analizată accesibilitatea este foarte bună, datorită configurației terenului și a drumurilor județene DJ 121A Aita Mare – Valea Crișului și DJ 131 Aita Mare – Satu Nou.

De asemenea, pășunile sunt traversate de câteva drumuri de pământ care pot fi utilizate cu succes pe vreme uscată pe care pot circula mijloace auto care să efectueze în bune condiții, în sezonul primăvară - vară - toamnă, toate transporturile necesare. De asemenea, acestea sunt folosite și pentru accesul animalelor la și de la pășune.

6.7.2. Alimentarea cu apă

Asigurarea apei în pășune este vitală pentru creșterea animalelor, iar modul de amenajare a surselor de apă depinde în mare măsură de proveniența lor. Cel mai indicat



este folosirea surselor de apă naturală (râuri, izvoare, fântâni), care să nu fie afectate de poluare.

În general, animalele beau multă apă, consumul de apă fiind în strânsă legătură cu conținutul de substanță uscată ingerată. În mod obișnuit, pentru 1kg SU ingerată, bovinele au nevoie de 4-5 l apă, iar ovinele și cabalinele de 2-3 l apă.

În cuprinsul pășunii analizate alimentarea cu apă a animalelor se face din pâraiele cu debit permanent ce străbat pășunea.

6.7.3. Locuințe și adăposturi pentru oameni și animale

Construcțiile pastorale existente pe trupurile de pășune analizate sunt reprezentate de șase stâni mobile, ce pot fi deplasate pe întreg teritoriul.

Stâna este o construcție unde se face prepararea laptelui de oaie și a brânzeturilor și unde ciobanii au locuința de vară. Acestea au vedere largă spre trupurile de pășune și sunt amplasate cu spatele către vântul dominant și cu celarul (încăperea pentru păstrarea alimentelor și a obiectelor casnice) orientat către nord, nord - est, nord - vest, pentru că este necesar ca în această încăpere să fie în permanență răcoare, deci să nu fie în bătaia directă a razelor solare.

6.7.4. Lucrări tehnice și instalații (împrejmuiri)

Pentru o mai bună exploatare a pajiștilor sunt necesare unele împrejmuiuri sub formă de garduri din lemn sau sârmă și stâlpi de beton, ce servesc la delimitarea tarlalelor, la separarea unora care se vor supraînsămânța, la separarea unor fânețe de pășuni, la împrejmuirea stânelor, plantațiilor, etc.


Gardurile temporare reprezintă un sistem eficient pentru pășunatul rațional, modalitate rapidă de a regla suprafața de pajiște la cerințele reale ale animalelor, de a păstra densitatea optimă a animalelor și pentru gestionarea corectă a cantității de masă verde consumată.

Gardul electric constituie un mijloc foarte eficient pentru organizarea pășunatului pe tarlale, pentru delimitarea parcelelor sau pentru protejarea împotriva animalelor sălbatice, mai ales că și configurația terenului permite acest lucru.

Gardul electric funcționează pe principiul producerii unor șocuri de înaltă tensiune, dar de intensitate joasă și de scurtă durată, asupra animalului care atinge conductorul gardului, prin închiderea unui circuit electric între conductor și pământ prin corpul animalului. Gardurile electrice moderne folosesc pentru alimentare baterii de acumuloare care sunt menținute încărcate cu instalații cu panouri fotovoltaice.

Stâlpii pentru gardul electric pot fi din lemn, metalici, fibre de sticlă sau mase plastice dure, iar conductorii sunt din sârmă zincată, conductori rotunzi acoperți de împletituri din lițe de cupru sau conductori sub formă de panglică.

Pe lângă avantajele legate de sporirea gradului de valorificare a ierbii prin pășunatul porționat cu „păstorul” electric se reduce numărul păstorilor care pot efectua alte lucrări necesare pe pajiști în perioada de pășunat.



7. DIVERSE

7.1. DATA INTRĂRII ÎN VIGOARE A AMENAJAMENTULUI; DURATA ACESTUIA

Prezentul studiu intră în vigoare la data de 01.01.2020 și are o aplicabilitate de 10 ani.

7.2. COLECTIVUL DE ELABORARE A PROIECTULUI


- A. Descrieri parcelare
 - ing. Raclariu Ioan
- B. Redactarea amenajamentului
 - șef proiect: ing. Vodă Alexandru
 - proiectant: ing. Vodă Alexandru
- C. Consultant
 - dr. ing. Marușca Teodor


7.3. INDICAREA HĂRȚILOR AMENAJAMENTULUI

Acest studiu are anexate următoarele hărți:
- harta generală la scara 1: 20.000 pe care sunt figurate trupurile de pășune, parcelele, cursurile de apă, culmile mai importante și căile de acces. De asemenea, pe hartă sunt prezentate pășunile analizate pe categorii de folosință.

7.4. BIBLIOGRAFIE

1. *Normativ pentru elaborarea studiilor de amenajare a pășunilor*.....I.C.A.S. 1984
2. *Norme tehnice pentru amenajarea pădurilor*.....I.C.A.S. 1986
3. O.M. nr. 264 /26.03.1999.....București 1999
4. Constantin Chiriță - Stațiuni forestiere - Ed. Academiei R.S.R.....București 1977
5. Dumitru Romulus Târziu - Pedologie și Stațiuni forestiere - Ed. Silvodel...Brașov 2006
6. Bărbulesc C. și colaboratori
Determinator pentru flora pajiștilor cu elemente de tehnologie.....București 1977
7. Pașcovechi - Leandru
Tipuri de pădure din R.P.R......București 1956
8. Teodor MARUȘCA și colaboratorii
Ghid de întocmire a amenajamentelor pastorale - I.C.D.P. Brașov.....2014






8. DESCRIEREA PARCELARĂ

8.1. PASUNI

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	1A	5,9	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 17°		Exp: SV		Alt: 520 - 560 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Agrostis capillaris</i> Acop. erbacee: 100%							
Gram: 68% (<i>Festuca r.</i> 40%, <i>Agrostis c.</i> 15%, <i>Cynosurus c.</i> 4%, <i>Anthraganthum o.</i> 4%, <i>Poa p.</i> 2%, <i>Calamagrostis e.</i> , <i>Dactylis g.</i>)							
Leg: 8% (<i>Trifolium r.</i> 4%, <i>Medicago f.</i> 2%, <i>Vicia c.</i> 1%, <i>Trifolium p.</i> 1%)							
Div. pl: 20% (<i>Achillea m.</i> 10%, <i>Plantago m.</i> 2%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Centaurea sp.</i> 2%, <i>Daucus c.</i> 2%, <i>Primula v.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%, <i>Potentilla sp.</i>)							
Pl. dăunăt. – toxice: 4% (<i>Ranunculus a.</i> 2%, <i>Crocus v.</i> 2%)							
Val. past: Bună		Arbuști: Păducel		Gr. acop: 1%		Răsp:	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Rare exemplare de păr pădureț. Pe lângă părau, regenerare naturală de SAC.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Defrișarea vegetației arbustive. Supraînsămânțări.							
Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant mijlociu	Config. ondulat
1	1B	1,4	F.P.	5232	Pășune împădurită		
Încl: 17°		Exp: S		Alt: 550 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: Acop. erbacee: %							
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest: 7CA 2JU 1ST		Vârsta: 60 ani		Consist: 0,6		Răsp: Volum: 215 mc	
Date compl: Diseminat: FA							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant mijlociu	Config. ondulat
1	1C	1,8	P.P.	5232	Pășune împădurită		
Încl: 10°		Exp: S		Alt: 600 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: Acop. erbacee: %							
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest: 10CA		Vârsta: 40 ani		Consist:		Răsp: Volum: 216 mc	
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	1D	18,3	F.p.	5232	Fâneată		
Încl: 15° Exp: S Alt: 550 - 600 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. supliment:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 80 %							
Gram: 70% (<i>Agrostis c.</i> 30%, <i>Festuca r.</i> 18%, <i>Arrhenatherum e.</i> 5%, <i>Dactylis g.</i> , <i>Anthoxanthum a.</i> , <i>Cynosurus c.</i>).....							
Leg: 5% (<i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Medicago f.</i> 1%, <i>Lotus c.</i> 1%, <i>Trifolium r.</i> 1%)							
Div. pl: 17% (<i>Achillea m.</i> 5%, <i>Centaurea sp.</i> 2%, <i>Potentilla</i> 2%, <i>Daucus c.</i> 3%, <i>Galium v.</i> 3%, <i>Taraxacum of.</i> 1%, <i>Fragaria v.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 8% (<i>Cirsium a.</i> 3%, <i>Dipsacus s.</i> 2%, <i>Ranunculus a.</i> 2%, <i>Euphorbia c.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie Arbusti: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Livadă de pomi fructiferi cu consistența 0,2							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	2	56,7	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 17° Exp: NE Alt: 550-580 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. supliment:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 95%							
Gram: 78% (<i>Festuca r.</i> 53%, <i>Dactylis g.</i> 7%, <i>Agrostis c.</i> 7%, <i>Poa p.</i> 3%, <i>Festuca p.</i> 3%, <i>Agropyron r.</i> 5%)							
Leg: 5% (<i>Trifolium p.</i> 3%, <i>Trifolium r.</i> 1%, <i>Medicago f.</i> 1%, <i>Vicia v.</i> 1%)							
Div. pl: 13% (<i>Achillea m.</i> 5%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Primula v.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 2%, <i>Plantago m.</i> 1%, <i>Cichorium i.</i> 1%, <i>Daucus c.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 4% (<i>Dipsacus s.</i> 2%, <i>Ranunculus sp.</i> 1%, <i>Euphorbia c.</i> 1%)							
Val. past: Bună Arbusti: Măceș, Păducel Gr. acop: 3% Răsp: uniform							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Pe alocuri pajiștea a fost incendiată de proprietari. Regenerare naturală de SAC de 3-10 ani pe 2%. Mușuroaie înierbate pe 2%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 ani și a vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
2	3	46,0	P.P.	5232	Fâneată		
Încl: 17° Exp: V Alt: 470-510 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. supliment:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Agrostis capillaris</i> Acop. erbacee: 100 %							
Gram: 73% (<i>Festuca r.</i> 31%, <i>Agrostis c.</i> 17%, <i>Dactylis g.</i> 10%, <i>Agropyron r.</i> 7%, <i>Arrhenatherum e.</i> 5%, <i>Anthoxanthum o.</i> 3%)							
Leg: 10% (<i>Trifolium p.</i> 5%, <i>Medicago f.</i> 2%, <i>Vicia v.</i> 1%, <i>Lotus c.</i> 1%, <i>Trifolium r.</i> 1%)							
Div. pl: 14% (<i>Achillea m.</i> 5%, <i>Centaurea sp.</i> 4%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 1%, <i>Filipendula h.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> , <i>Daucus c.</i>)							
Pl. dăunăt. – toxice: 3% (<i>Cirsium a.</i> 3%)							
Val. past: Mijlocie Arbusti: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Mușuroaie înierbate pe 5%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Versant	Config. ondulat
1	4	75,2	F.P.	5232	Fâneată		
Incl: 17 ⁹ Exp: SV Alt: 500-580 m Sol: brun luvic-tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i> Acop. erbacee: 97%							
Gram: 68% (<i>Festuca r.</i> 29 %, <i>Arrhenatherum e.</i> 18%, <i>Dactylis g.</i> 15%, <i>Agrostis c.</i> 2%, <i>Agropyron r.</i> 2%, <i>Briza m.</i> 1%, <i>Calamagrostis e.</i> 1%)							
Leg: 8% (<i>Medicago f.</i> 3%, <i>Trifolium p.</i> 3%, <i>Lathyrus p.</i> 1%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 17% (<i>Cichorium i.</i> 3%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Daucus c.</i> 2%, <i>Achillea m.</i> 2%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Plantago l.</i> 2%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Filipendula h.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 7% (<i>Dipsacus s.</i> 5%, <i>Cirsium a.</i> 1%, <i>Hypericum p.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie Arbuști: Păducel și Măceș Gr. acop: 3% Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Mușuroaie înierbate pe 2%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsământări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	5A	24,5	F.P.	5232	Fâneată		
Incl: 20 ⁹ Exp: SE Alt: 520-600m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i> Acop. erbacee: 100%							
Gram: 65% (<i>Festuca r.</i> 23%, <i>Arrhenatherum e.</i> 17%, <i>Dactylis g.</i> 10%, <i>Agrostis c.</i> 10%, <i>Agropyron r.</i> 5%)							
Leg: 10% (<i>Trifolium p.</i> 6%, <i>Medicago f.</i> 2%, <i>Lathyrus p.</i> 1%, <i>Trifolium r.</i> 1%)							
Div. pl: 20% (<i>Centaurea sp.</i> 4%, <i>Cichorium i.</i> 3%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Filipendula h.</i> 2%, <i>Plantago l.</i> 2%, <i>Daucus c.</i> 2%, <i>Achillea m.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 5% (<i>Cirsium sp.</i> 3%, <i>Dipsacus s.</i> 1%, <i>Hypericum p.</i> 1%)							
Val. past: Bună Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsământări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant superior	Config. ondulat
1	5B	30,6	F.P.	5232	Pășune (livadă)		
Incl: 18 ⁹ Exp: S Alt: 560-620 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Arrhenatherum elatius</i> – <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 67 %							
Gram: 65% (<i>Arrhenatherum e.</i> 25%, <i>Festuca r.</i> 15%, <i>Agropyron r.</i> 13%, <i>Dactylis g.</i> 7%, <i>Agrostis c.</i> 3%, <i>Calamagrostis e.</i> 2%)							
Leg: 5% (<i>Medicago f.</i> 2%, <i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Lathyrus p.</i> 1%, <i>Lotus c.</i> %)							
Div. pl: 18% (<i>Daucus c.</i> 4%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Cichorium i.</i> 3%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Achillea m.</i> 2%, <i>Galium v.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Potentilla sp.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 12% (<i>Dipsacus s.</i> 6%, <i>Cirsium sp.</i> 3%, <i>Carduus a.</i> 2%)							
Val. past: Bună Arbuști: Măceș și păducel Gr. acop: 3% Răsp: uniform							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Livadă de meri, peri și pruni cu consistența 0,3.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsământări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	6A	40,2	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 15° (5-20)		Exp: SV		Alt: 520-650 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplîm:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 99%			
Gram: 72% (<i>Agrostis c.</i> 27%, <i>Festuca r.</i> 20%, <i>Dactylis g.</i> 12%, <i>Arrhenatherum e.</i> 7%, <i>Phleum p.</i> 3%, <i>Briza m.</i> 2%, <i>Calamagrostis e.</i> 1%)							
Leg: 9% (<i>Trifolium r.</i> 5%, <i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 2%)							
Div. pl: 14% (<i>Daucus c.</i> 3%, <i>Achillea m.</i> 3%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Cichorium i.</i> 2%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Potentilla sp.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Fragaria v.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 5% (<i>Cirsium sp.</i> 3%, <i>Dipsacus s.</i> 1%, <i>Hypericum p.</i> 1%)							
Val. past: Bună		Arbuști: Măceș și păducel		Gr. acop: 1%		Răsp:	
Veget. forest.		Vârsta:		Consist:		Răsp:	
Date compl:		Pe limita cu parcela 5 (pe lângă părau), regenerare naturală de SAP, ANN.		Volum:			
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Versant	Config. ondulat
1	6B	5,0	F.P.	5232	Pășune (livadă)		
Încl: 20°		Exp: V		Alt: 600 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplîm:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 70%			
Gram: 70% (<i>Agrostis c.</i> 20%, <i>Festuca r.</i> 20%, <i>Dactylis g.</i> 15%, <i>Arrhenatherum e.</i> 10%, <i>Agropyron r.</i> 3%, <i>Phleum p.</i> 1%, <i>Briza m.</i> 1%)							
Leg: 5% (<i>Trifolium p.</i> 3%, <i>Trifolium r.</i> 1%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 15% (<i>Daucus c.</i> %, <i>Plantago m.</i> %, <i>Cichorium i.</i> %, <i>Centaurea sp.</i> %, <i>Agrimonia e.</i> %, <i>Achillea m.</i> %, <i>Fragaria v.</i> %, <i>Galium v.</i> %)							
Pl. dăunăt. – toxice: 10% (<i>Dipsacus s.</i> 4%, <i>Carduus a.</i> 3%, <i>Cirsium sp.</i> 3%, <i>Rumex a.</i> %)							
Val. past: Bună		Arbuști: Păducel și măceș		Gr. acop: 5%		Răsp:	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp:	
						Volum:	
Date compl: În u.a. un pâlci de CA și FA de 40-50 de ani de cca. 0,2 ha. Livadă de meri și peri cu consistența 0,2.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant superior	Config. ondulat
1	7	20,2	F.P.	5232	Pășune		
Încl: 15°		Exp: SV		Alt: 600-650 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplîm:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i>		Acop. erbacee: 85 %					
Gram: 70% (<i>Festuca r.</i> 40%, <i>Nardus s.</i> 10%, <i>Agrostis c.</i> 10%, <i>Calamagrostis e.</i> 5%, <i>Briza m.</i> 3%, <i>Poa p.</i> 2%)							
Leg: 3% (<i>Trifolium r.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 22% (<i>Thymus m.</i> 7%, <i>Achillea m.</i> 6%, <i>Hieracium sp.</i> 3%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Potentilla sp.</i> 2%, <i>Taraxacum of.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 5% (<i>Euphorbia c.</i> 2%, <i>Cirsium sp.</i> 1%, <i>Carduus a.</i> 1%, <i>Hypericum p.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști: Păducel, măceș, porumbar		Gr. acop: 5%		Răsp:	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp:	
Date compl:		Mușuroaie înierbate pe 20%. Rămături de misteți pe 10%.		Volum:			
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Nivelarea și supraînsămânțarea rămăturilor de misteți. Defrișarea vegetației arbustive. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	8A	17,0	F.P.	5232	Pășune		
Încl: 17°		Exp: NE		Alt: 640-660 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 99%			
Gram: 75% (<i>Agrostis c.</i> 30%, <i>Festuca r.</i> 24%, <i>Dactylis g.</i> 8%, <i>Arrhenatherum e.</i> 4%, <i>Anthoxantum o.</i> 2%, <i>Briza m.</i> 2%, <i>Calamagrostis e.</i> 2%, <i>Nardus s.</i> 3%)							
Leg: 8% (<i>Trifolium r.</i> 4%, <i>Lotus c.</i> 2%, <i>trifolium p.</i> 1%, <i>Medicago f.</i> 1%)							
Div. pl: 12% (<i>Achillea m.</i> 2%, <i>Daucus c.</i> 2%, <i>Plantago l.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Hieracium p.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 5% (<i>Cirsium sp.</i> 3%, <i>Carduus a.</i> 1%, <i>Euphorbia c.</i> 1%)							
Val. past: Bună		Arbuști: Măceș, păducel		Gr. acop: 1%		Răsp: uniform	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp:	
						Volum:	
Date compl: Mușuroaie înierbate pe 5%							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant mijlociu	Config. ondulat
1	8B	6,3	F.P.	5232	Pășune cu arbori		
Încl: 10°		Exp: NE		Alt: 620-650 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 80 %			
Gram: 80% (<i>Festuca r.</i> 60%, <i>Calamagrostis e.</i> 7%, <i>Poa p.</i> 6%, <i>Luzula sp.</i> 3%, <i>Nardus s.</i> 3%, <i>Cynosurus c.</i> 1%)							
Leg: 2% (<i>Trifolium r.</i> 2%)							
Div. pl:11% (<i>Fragaria v.</i> 4%, <i>Achillea m.</i> 3%, <i>Potentilla r.</i> 1%, <i>Anemone m.</i> 1%, <i>Cichorium i.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice:7% (<i>Urtica d.</i> 5%, <i>Ranunculus f.</i> 1%, <i>Cirsium sp.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest: 10 FA		Vârsta: 130 ani		Consist: 0,2		Răsp: uniform Volum: 368 mc	
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Reducerea consistenței la 0,1. Scos cioate. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant superior	Config. ondulat
1	8C	27,2	F.P.	5152	Pășune cu arbori		
Încl: 15°		Exp: SE		Alt: 640-720 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Nardus stricta</i>				Acop. erbacee: 53 %			
Gram: 75% (<i>Festuca r.</i> 35%, <i>Nardus s.</i> 15%, <i>Calamagrostis e.</i> 10%, <i>Agrostis c.</i> 10%, <i>Poa p.</i> 2%, <i>Cynosurus c.</i> 2%, <i>Luzula s.</i> 1%)							
Leg: 2% (<i>Trifolium r.</i> 2%)							
Div. pl: 17% (<i>Achillea m.</i> 5%, <i>Thymus m.</i> 3%, <i>Taraxacum of.</i> 2%, <i>Plantago l.</i> 2%, <i>Hieracium p.</i> 2%, <i>Teucrium ch.</i> 1%, <i>Veronica ch.</i> 1%, <i>Ononis sp.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 6% (<i>Euphorbia c.</i> 2%, <i>Cirsium sp.</i> 2%, <i>Ranunculus f.</i> 2%)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști: <i>Măceș și păducel</i>			Gr. acop: 5%		Răsp:
Veget. forest: 5GO 4FA 1CA		Vârsta: 130 ani		Consist: 0,2		Răsp: uniform	Volum: 1904 mc
Date compl: Regenerare naturală de CA, FA, ME de 5 ani pe 0,2 S. Mușuroaie înierbate pe 5%. Râmături de misteți pe 2%.							
Lucr. exec: 2019 – îndepărtarea vegetației arbustive (mecanizat).							
Lucr. prop: Reducerea consistenței la 0,1. Scos cioate. Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 de ani și a vegetației arbustive. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Nivelarea și însămânțarea râmăturilor de misteți. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief	Config.
1	9	31,6	F.P.	5152	Pășune	Versant	ondulat
Încl: 15° Exp: V Alt: 600-680 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 95 %							
Gram: 74% (<i>Festuca r.</i> 45%, <i>Agrostis c.</i> 10%, <i>Nardus s.</i> 10%, <i>Deschampsia c.</i> 5%, <i>Cynosurus c.</i> 2%, <i>Poa p.</i> 2%)							
Leg: 5% (<i>Trifolium r.</i> 3%, <i>Trifolium p.</i> 1%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 16% (<i>Achillea m.</i> 4%, <i>Taraxacum of.</i> 3%, <i>Plantago l.</i> 2%, <i>Thymus m.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Veronica ch.</i> 1%, <i>Daucus c.</i> 1%, <i>Potentilla r.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 5% (<i>Euphorbia c.</i> 3%, <i>Hypericum p.</i> 1%, <i>Cirsium sp.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie Arbusti: <i>Măceș și păducel</i> Gr. acop: 3% Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Mușuroaie înierbate pe 2%. Rămături de mistreț pe 2%. Rare exemplare bătrâne de FA și CA.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Nivelarea și supraînsămânțarea rămăturilor de mistreți. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief	Config.
1	10	25,7	F.P.	5152	Pășune	versant superior	ondulat
Încl: 20° (10-25) Exp: S Alt: 580-670 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Nardus stricta</i> Acop. erbacee: 70 %							
Gram: 75% (<i>Festuca r.</i> 40%, <i>Nardus s.</i> 18%, <i>Agrostis c.</i> 10%, <i>Cynosurus c.</i> 3%, <i>Deschampsia c.</i> 2%, <i>Poa p.</i> 2%)							
Leg: 3% (<i>Trifolium r.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 16% (<i>Achillea m.</i> 4%, <i>Thymus m.</i> 3%, <i>Hieracium p.</i> 3%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 6% (<i>Euphorbia c.</i> 3%, <i>Cirsium sp.</i> 1%, <i>Ranunculus f.</i> 1%, <i>Hypericum p.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie Arbusti: <i>Măceș, păducel, ienupăr</i> Gr. acop: 10% Răsp: uniform							
Veget. forest: 10FA Vârsta: 120 ani Consist: 0,1 Răsp: uniform Volum:							
Date compl: Regenerare naturală de FA și ME de 5 ani pe 5%. Mușuroaie înierbate pe 10%. Rămături de mistreți pe 5%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 de ani și a vegetației arbustive. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Nivelarea și supraînsămânțarea rămăturilor de mistreți. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief	Config.
1	11	42,5	F.P.	5152	Pășune	Versant	ondulat
Încl: 15° Exp: E Alt: 600-740 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Agrostis capillaris</i> Acop. erbacee: 100%							
Gram: 70% (<i>Festuca r.</i> 22%, <i>Agrostis c.</i> 17%, <i>Nardus s.</i> 10%, <i>Deschampsia c.</i> 8%, <i>Calamagrostis e.</i> 5%, <i>Holcus l.</i> 3%, <i>Anthoxanthum o.</i> 3%, <i>Briza m.</i> 2%)							
Leg: 7% (<i>Trifolium r.</i> 4%, <i>Lotus c.</i> 2%, <i>Trifolium p.</i> 1%)							
Div. pl: 18% (<i>Achillea m.</i> 4%, <i>Plantago l.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Thymus m.</i> 1%, <i>Hieracium p.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%, <i>Daucus c.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 5% (<i>Cirsium sp.</i> 3%, <i>Pteridium a.</i> 1%, <i>Euphorbia c.</i> 1%, <i>Hypericum p.</i> %)							
Val. past: Mijlocie Arbusti: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Rare exemplare bătrâne de FA, GO și CA. Mușuroaie înierbate pe 1%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	12A	19,8	F.P.	5152	Pășune		
Încl: 15°		Exp: N		Alt: 680-740m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Agrostis capillaris</i>					Acop. erbacee: 98%		
Gram: 68% (<i>Festuca r.</i> 27%, <i>Agrostis c.</i> 20%, <i>Nardus s.</i> 12%, <i>Calamagrostis e.</i> 8%, <i>Deschampsia c.</i> 7%, <i>Holcus l.</i> 4%)							
Leg: 5% (<i>Trifolium r.</i> 5%)							
Div. pl: 20% (<i>Achillea m.</i> 11%, <i>Plantago l.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Thymus m.</i> 2%, <i>Daucus c.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%, <i>Galium v.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 7% (<i>Cirsium a.</i> 4%, <i>Pteridium a.</i> 2%, <i>Euphorbia c.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști: <i>Măceș</i> și <i>păducel</i>			Gr. acop: 2%		Răsp: uniform
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Mușuroaie înierbate pe 10%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	12B	21,3	F.P.	5152	Pășune		
Încl: 17°		Exp: NE		Alt: 620-740 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Agrostis capillaris</i>				Acop. erbacee: 97%			
Gram: 74% (<i>Festuca r.</i> 27%, <i>Agrostis c.</i> 18%, <i>Nardus s.</i> 10%, <i>Deschampsia c.</i> 8%, <i>Calamagrostis e.</i> 7%, <i>Holcus l.</i> 4%)							
Leg: 6% (<i>Trifolium r.</i> 3%, <i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 15% (<i>Achillea m.</i> 5%, <i>Daucus c.</i> 2%, <i>Thymus m.</i> 2%, <i>Taraxacum of.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 1%, <i>Hieracium p.</i> 1%, <i>Galium v.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 5% (<i>Cirsium a.</i> 2%, <i>Pteridium a.</i> 1%, <i>Hypericum p.</i> 1%, <i>Euphorbia c.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști: Măceș și păducel		Gr. acop: 3%		Răsp: uniform	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp:	
						Volum:	
Date compl: În u.a. o adăpătoare. Rare exemplare bătrâne de FA. Mușuroaie înierbate pe 7%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant superior	Config. ondulat
1	12C	24,6	F.P.	5152	Pășune cu arbori		
Încl: 15°		Exp: NE		Alt: 700-750 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 65%			
Gram: 75% (<i>Agrostis c.</i> 32%, <i>Festuca r.</i> 15%, <i>Deschampsia c.</i> 10%, <i>Calamagrostis e.</i> 10%, <i>Holcus l.</i> 3%, <i>Nardus s.</i> 3%, <i>Poa p.</i> 2%)							
Leg: 3% (<i>Trifolium sp.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 15% (<i>Lysmachia v.</i> 3%, <i>Daucus c.</i> 3%, <i>Achillea m.</i> 3%, <i>Clinopodium v.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Ajuga sp.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 7% (<i>Cirsium sp.</i> 3%, <i>Pteridium a.</i> 2%, <i>Carduus a.</i> 2%)							
Val. past: Bună		Arbuști: Păducel și măceș			Gr. acop: 5%		Răsp: uniform
Veget. forest: 7FA 2GO 1CA		Vârsta: 130 ani		Consist: 0,2		Răsp: uniform	Volum: 1377 mc
Date compl: Regenerare naturală de CA, ME și FA de 5 ani pe 0,1S.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Reducerea consistenței la 0,1. Scos cioate. Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 de ani și a vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant inferior	Config. ondulat
1	12D	5,9	P.P.	5232	Pășune împădurită		
Încl: 25°		Exp: NE		Alt: 690 m		Sol: brun eumezobazic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:	Gr. acop:	Răsp:			
Veget. forest:		Vârsta:	Consist:	Răsp:	Volum: 1240 mc		
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	13A	54,6	F.P.	5232	Pășune		
Încl: 17°		Exp: SV		Alt: 640-700 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 65%			
Gram: 77% (<i>Agrostis c.</i> 30%, <i>Festuca r.</i> 20%, <i>Deschampsia c.</i> 10%, <i>Cynosurus c.</i> 5%, <i>Calamagrostis e.</i> 5%, <i>Holcus l.</i> 3%, <i>Briza m.</i> 2%, <i>Nardus s.</i> 2%, <i>Bothriochloa i</i>)							
Leg: 7% (<i>Trifolium r.</i> 3%, <i>Lotus c.</i> 2%, <i>Medicago f.</i> 1%, <i>Trifolium p.</i> 1%)							
Div. pl: 18% (<i>Daucus c.</i> 4%, <i>Achillea m.</i> 3%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Centaurea sp.</i> 2%, <i>Plantago l.</i> 2%, <i>Hieracium p.</i> 1%, <i>Potentilla sp.</i> 1%, <i>Thymus m.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%, <i>Fragaria v.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 8% (<i>Carduus a.</i> 4%, <i>Cirsium sp.</i> 2%, <i>Euphorbia c.</i> 1%, <i>Dipsacus s.</i> 1%)							
Val. past: Bună		Arbuști: păducel, ienupăr, măceș		Gr. acop: 30%		Răsp: uniform	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp:	
Date compl: Regenerare naturală de CA, ME și FA pe 5% de 5-10 ani. Mușuroaie înierbate pe 3%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 de ani și a vegetației arbustive. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	13B	11,8	P.P.	5152	Pășune împădurită		
Încl: 20º		Exp: SV		Alt: 640 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplimentare:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunătoare – toxice:							
Val. past:		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest: 5CA 2GO 2FA 1ME		Vârsta: 60 ani		Consist: 0,8		Răsp: Volum: 1930 mc	
Date complet:							
Lucr. executat:							
Lucr. propus:							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	13C	6,1	P.P.	5232	Pășune împădurită		
Încl: 20°		Exp: V		Alt: 680 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest:		8FA 1GO 1CA		Vârsta: 110 ani		Consist: 0,6 Răsp: uniform Volum: 1303 mc	
Date compl: Regenerare naturală de FA, CA și ME de 5-10 ani pe 0,4S.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant inferior	Config. ondulat
1	13D	3,9	P.P.	5232	Pășune împădurită		
Încl: 20°		Exp: V		Alt: 640 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest: 10FA		Vârsta: 120 ani		Consist: 0,7		Răsp: uniform Volum: 1268 m	
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							


Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant superior	Config. ondulat
1	14A	16,3	F.P.	5232	Pășune		
Încl: 23°		Exp: S		Alt: 560-680 m		Sol: brun eumezobazic tipic	
Date staț. suplimentare:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 60 %			
Gram. 65% (<i>Agrostis</i> c. 29%, <i>Festuca</i> r. 20%, <i>Calamagrostis</i> e. 7%, <i>Deschampsia</i> c. 3%, <i>Holcus</i> l. 2%, <i>Cynosurus</i> c. 2%, <i>Briza</i> m. 1%, <i>Arrhenatherum</i> e 1%)							
Leg: 7% (<i>Trifolium</i> r. 4%, <i>Trifolium</i> p. 1%, <i>Medicago</i> f. 1%, <i>Lotus</i> c. 1%)							
Div. pl: 23% (<i>Achillea</i> m. 10%, <i>Plantago</i> m. 3%, <i>Galium</i> v. 2%, <i>Taraxacum</i> of. 2%, <i>Thymus</i> m. 2%, <i>Cichorium</i> i. 1%, <i>Daucus</i> c. 1%, <i>Agrimonia</i> e. 1%, <i>Fragaria</i> v. 1%)							
Pl. dăunătoare – toxice: 5% (<i>Carduus</i> a. 2%, <i>Cirsium</i> a. 2%, <i>Hypericum</i> p. 1%, <i>Euphorbia</i> c.)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști: <i>Ienupăr</i> , <i>măceș</i> , <i>păducel</i> , <i>porumbar</i>			Gr. acop: 35%		Răsp: mixt
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date complet: Rare exemplare bătrâne de GO. Regenerare naturală de ME și CA de 5 ani pe 5%.							
Lucr. executat:							
Lucr. propus: Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 de ani și a vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief luncă înaltă	Config. plană
1	14B	21,7	F.P.	5232	Pășune		
Încl: 3 ⁹		Exp:		Alt: 550m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 100%			
Gram:60% (<i>Agrostis c.</i> 20%, <i>Festuca r.</i> 15%, <i>Lolium p.</i> 13%, <i>Holcus l.</i> 3%, <i>Cynosurus c.</i> 3%, <i>Arrhenatherum e.</i> 3%, <i>Deschampsia c.</i> 3%)							
Leg: 20% (<i>Trifolium r.</i> 15%, <i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Medicago f.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl:15% (<i>Achillea m.</i> 4%, <i>Plantago m.</i> 3%, <i>Taraxacum of.</i> 2%, <i>Daucus c.</i> 2%, <i>Potentilla sp.</i> 1%, <i>Cichorium i.</i> 1%, <i>Galium v.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice:5% (<i>Carduus a.</i> 3%, <i>Cirsium v.</i> 2%, <i>Dipsacus s.</i> , <i>Ranunculus a.</i>)							
Val. past: Bună		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp:	
						Volum:	
Date compl: Rare exemplare de ANN pe lângă pârau.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief luncă înaltă	Config. plană
1	14C	9,2	F.P.	5232	Pășune		
Încl: 3 ⁹		Exp:	Alt: 560 m		Sol: brun luvic tipic		
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 100%			
Gram: 62% (<i>Agrostis c.</i> 20%, <i>Festuca r.</i> 17%, <i>Lolium p.</i> 14%, <i>Cynosurus c.</i> 3%, <i>Arrhenatherum e.</i> 3%, <i>Deschampsia c.</i> 3%, <i>Holcus l.</i> 2%)							
Leg: 18% (<i>Trifolium r.</i> 14%, <i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Medicago f.</i> 1%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 15% (<i>Achillea m.</i> 5%, <i>Taraxacum of.</i> 2%, <i>Plantago m.</i> 2%, <i>Potentilla sp.</i> 2%, <i>Cichorium i.</i> 1%, <i>Galium v.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Daucus c.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 5% (<i>Carduus a.</i> 2%, <i>Dipsocus s.</i> 1%, <i>Cirsium a.</i> 1%, <i>Ranunculus a.</i> 1%)							
Val. past: Bună		Arbuști:		Gr. acop:	Răsp:		
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:	Răsp:	Volum:	
Date compl: Pe lângă pârau, exemplare de ANN de 60-70 ani.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant mijlociu	Config. ondulat
1	14D	3,5	F.P.	5232	Pășune împădurită		
Încl: 25°		Exp: E		Alt: 560-670 m		Sol: brun luvic litic	
Date stat. suplim:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest: 4CA 4FA 1JU		Vârsta: 30 ani		Consist: 1,0		Răsp: uniform Volum: 545 mc	
Date compl: Diseminat: GO, PLT, PAM, ME.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	15A	47,5	F.P.	5232	Pășune		
Încl: 20°		Exp: NE		Alt: 580-700 m		Sol: brun eumezobazic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>					Acop. erbacee: 70%		
Gram: 69% (<i>Agrostis c.</i> 32%, <i>Festuca r.</i> 20%, <i>Calamagrostis e.</i> 6%, <i>Deschampsia c.</i> 5%, <i>Nardus s.</i> 3%, <i>Holcus l.</i> 2%, <i>Briza m.</i> 1%)							
Leg: 6% (<i>Trifolium p.</i> 3%, <i>Trifolium r.</i> 2%, <i>Medicago f.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%)							
Div. pl: 18% (<i>Daucus c.</i> 3%, <i>Achillea m.</i> 4%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Taraxacum of.</i> 2%, <i>Thymus m.</i> 2%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Hieracium p.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 7% (<i>Cordus a.</i> %, <i>Cirsium a.</i> %, <i>Dipsacus s.</i> %, <i>Hypericum p.</i> %)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști: Măceș, păducel, ienupăr			Gr. acop: 20%		Răsp:
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Rare exemplare bătrâne de GO, CA, FA, ME. Mușuroaie înierbate pe 5%							
Lucr. exec: Regenerare naturală de ME, ANN, CA de 5-10 ani pe 0,1 S							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	15B	19,7	P.P.	5152	Pășune împădurită		
Încl: 20°		Exp: NE		Alt: 640-700 m		Sol: brun luvic tipic	
Date stat. suplim:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști: Păducel, măceș		Gr. acop: 20%		Răsp: mixt	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum: 4369 mc	
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Versant	Config. ondulat
1	16A	53,5	F.P.	5152	Pășune		
Încl: 17°		Exp: SE		Alt: 580-700 m		Sol: brun luvic tipic	
Date stat. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Calamagrostis epigeios</i>						Acop. erbacee: 85%	
Gram: 70% (<i>Agrostis c.</i> 25%, <i>Calamagrostis e.</i> 15%, <i>Deschampsia c.</i> 10%, <i>Festuca r.</i> 10%, <i>Holcus l.</i> 5%, <i>Nardus s.</i> 3%, <i>Cynosurus c.</i> 2%)							
Leg: 7% (<i>Trifolium r.</i> 5%, <i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> %)							
Div. pl: 15% (<i>Achillea m.</i> %, <i>Daucus c.</i> %, <i>Plantago m.</i> %, <i>Thymus m.</i> %, <i>Cichorium i.</i> %, <i>Agrimonia e.</i> %)							
Pl. dăunăt. – toxice: 8% (<i>Cordus a.</i> 4%, <i>Euphorbia c.</i> 3%, <i>Cirsium a.</i> 1%, <i>Ononis sp.</i> +)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști: ienupăr, păducel, măceș			Gr. acop: 10%		Răsp: mixt
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Rare exemplare bătrâne de GO, FA. Regenerare naturală de ME de 5 ani pe 5%. Pe limita cu 16B spre borna 27 bis. Regenerare naturală de PI de 30 de ani pe aproximativ 1000 mp.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 de ani și a vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant superior	Config. ondulat
1	16B	6,6	P.P.	5232	Pășune împădurită		
Încl: 20°		Exp: SE		Alt: 730-770 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest:		8FA 1GO 1CA		Vârsta:		Consist: 0,7 Răsp: Volum: 2152 mc	
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	16C	15,2	P.P.	5232	Pășune împădurită		
Încl: 20°		Exp: E		Alt: 580-660 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști: <i>Alun, mur, măceș, păducel</i>		Gr. acop: 30%		Răsp:	
Veget. forest:		6CA2ME1FA1SAC		Vârsta: 40 ani		Consist: 0,8 Răsp: uniform Volum: 1387 mc	
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	16D	9,0	P.P.	5132	Pășune împădurită		
Încl: 20°		Exp: S		Alt: 660 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum: 2553 mc	
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	17A	14,9	F.P.	5132	Pășune		
Încl: 15°		Exp: S		Alt: 580-640 m		Sol: brun luvic tipic	
Date stat. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Calamagrostis epigeios</i>						Acop. erbacee: 97%	
Gram: 67% (<i>Agrostis c.</i> 25%, <i>Calamagrostis e.</i> 17%, <i>Deschampsia c.</i> 11%, <i>Festuca r.</i> 7%, <i>Agrostis s.</i> 4%, <i>Cynosurus c.</i> 2%, <i>Holcus l.</i> 1%)							
Leg: 8% (<i>Trifolium r.</i> 5%, <i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> %)							
Div. pl: 10% (<i>Achillea m.</i> 3%, <i>Plantago sp.</i> 2%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Thymus m.</i> 1%, <i>Cichorium i.</i> 1%, <i>Daucus c. +</i> , <i>Fragaria v.</i> 2%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 15% (<i>Carduus a.</i> 8%, <i>Cirsium a.</i> 3%, <i>Urtica d.</i> 3%, <i>Mentha sp.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști: Măceș, păducel			Gr. acop: 2%		Răsp:
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Rare exemplare de CA, ME, PLT. Cioate de ME pe 1%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Scos cioate. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări. Defrișarea vegetației arbustive.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant superior	Config. ondulat
1	17B	5,1	F.P.	5132	Pășune		
Încl: 10°		Exp: N	Alt: 670 m		Sol: brun luvic tipic		
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Nardus stricta</i> – <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 100%			
Gram: 84% (<i>Nardus s.</i> 34%, <i>Festuca r.</i> 20%, <i>Deschampsia c.</i> 18%, <i>Agrostis c.</i> 7%, <i>Calamagrostis e.</i> 5%)							
Leg: 3% (<i>Trifolium r.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 10% (<i>Achillea m.</i> 3%, <i>Alchemilla v.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 2%, <i>Thymus m.</i> 3%, <i>Fragaria v.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 3% (<i>Ranunculus a.</i> 1%, <i>Juncus sp.</i> 2%)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Rare exemplare de ME. Mușuroaie înierbate pe 5%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări							


Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	17C	19,3	F.P.	5132	Pășune		
Încl: 17°		Exp: N		Alt: 620-680 m		Sol: brun luvic tipic	
Date stat. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>					Acop. erbacee: 50 %		
Gram: 70% (<i>Agrostis c.</i> 25%, <i>Festuca r.</i> 20%, <i>Calamagrostis e.</i> 10%, <i>Deschampsia c.</i> 10%, <i>Nardus s.</i> 5%, <i>Brachypodium p.</i> +)							
Leg: 7% (<i>Trifolium r.</i> 5%, <i>Lotus c.</i> 2%)							
Div. pl: 12% (<i>Achillea m.</i> 3%, <i>Centaurea sp.</i> 2%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%, <i>Fragaria v.</i> 1%, <i>Thymus m.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 8% (<i>Juncus ef.</i> 4%, <i>Cirsium a.</i> 2%, <i>Carduus a.</i> 1%, <i>Pteridium a.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști: Păducel, măceș			Gr. acop: 20% Răsp: mixt		
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Regenerare naturală de ME, CA, ANN pe 0,3S de 10-20 ani. Rare exemplare bătrâne de FA, CA, ME.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 de ani și a vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	17D	48,7	F.P.	5232	Pășune împădurită		
Încl: 20°		Exp: N	Alt: 620-660 m		Sol: brun luvic tipic		
Date staț. suplim:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:	Gr. acop:	Răsp:			
Veget. forest:		4CA3ME1FA1PLT1ANN	Vârsta:	Consist:	Răsp:	Volum: 8228 mc	
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	18A	12,3	F.P.	5232	Pășune	ondulat	ondulat
Încl: 17°		Exp: N	Alt: 660-720 m		Sol: brun luvic tipic		
Date stat. suplimentare:							
Tip pajiște: <i>Nardus stricta</i> – <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 100%			
Gram: 80% (<i>Nardus s.</i> 35%, <i>Festuca r.</i> 15%, <i>Deschampsia c.</i> 12%, <i>Calamagrostis e.</i> 10%, <i>Agrostis c.</i> 6%, <i>Brachypodium p.</i> 2%)							
Leg: 3% (<i>Trifolium r.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 14% (<i>Achillea m.</i> 2%, <i>Thymus m.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Alchemilla v.</i> 1%, <i>Potentilla a.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 3% (<i>Juncus ef.</i> 3%)							
Val. past: Slabă		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date complet: Mușuroaie înierbate pe 5%. Rare exemplare de GO, ME.							
Lucr. executat:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Suprainsămânțări. Fertilizări							


Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	18B	60,0	P.P.	5232	Pășune împădurită		
Încl: 20°		Exp: N		Alt: 580-660 m		Sol: brun luvic tipic	
Date stat. suplim:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest:		4ME3CA2ANN1PLT		Vârsta:		Consist: Răsp: Volum: 12425 mc	
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant superior	Config. ondulat
1	19A	19,1	F.P.	5232	Pășune		
Înci: 17 ^a		Exp: V	Alt: 620-680 m	Sol: brun luvic tipic			
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 85%			
Gram: 70% (<i>Agrostis c.</i> 30%, <i>Festuca r.</i> 20%, <i>Arrhematherum e.</i> 7%, <i>Deschampsia c.</i> 5%, <i>Nardus s.</i> 4%, <i>Holcus l.</i> 2%, <i>Brachypodium p.</i> 2%)							
Leg: 5% (<i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Medicago f.</i> 1%, <i>Trifolium r.</i> 1%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 18% (<i>Centaurea sp.</i> 4%, <i>Achillea m.</i> 3%, <i>Daucus c.</i> 2%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Filipandula h.</i> 2%, <i>Cichorium i.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 7% (<i>Pteridium a.</i> 4%, <i>Cirsium a.</i> 2%, <i>Euphorbia c.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști: Păducel, măceș		Gr. acop: 15%		Răsp: mixt	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Rare exemplare de ME, GO.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	19B	49,8	P.P.	5232	Pășune împădurită		
Înci: 20 ^a		Exp: V	Alt: 580-620 m		Sol: brun luvic tipic		
Date staț. suplim:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:	Gr. acop:	Răsp:			
Veget. forest:		Vârsta:	Consist:	Răsp:		Volum: 8419 mc	
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	20A	41,9	F.P.	5232	Pășune		
Încł: 20 ^a		Exp: SE		Alt: 560-660 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 70 %			
Gram: 70% (<i>Agrostis c.</i> 25%, <i>Festuca r.</i> 20%, <i>Cynosurus c.</i> 6%, <i>Arrhenatherum e.</i> 6%, <i>Calamagrostis e.</i> 5%, <i>Deschampsia c.</i> 4%, <i>Holcus l.</i> 2%, <i>Brachypodium p.</i> 2%)							
Leg: 5% (<i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Medicago f.</i> 1%, <i>Lotus c.</i> 1%, <i>Trifolium r.</i> 1%)							
Div. pl: 17% (<i>Daucus c.</i> 5%, <i>Centaurea sp.</i> 2%, <i>Achillea m.</i> 2%, <i>Plantago l.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Filipendula h.</i> 2%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Thymus m.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 8% (<i>Dipsocus s.</i> 4%, <i>Cirsium sp.</i> 2%, <i>Carduus a.</i> 1%, <i>Juncus sp.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști: Păducel și măceș			Gr. acop: 20%		Răsp: mixt
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp:	Volum:
Date compl: Regenerare naturală de CA, GO și ANN pe 0,1S de 10-20 ani. Rare exemplare bătrâne de GO, CA și ANN.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 de ani și a vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	20B	13,0	P.P.	5132	Fâneată împădurită		
Încl: 23° Exp: SV Alt: 550-620 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: Acop. erbacee: %							
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past: Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: 4CA 2GO 2PI 1FA 1ANN Vârsta: 50 ani Consist: 0,8 Răsp: uniform Volum: 2454 mc							
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	21	56,7	F.P.	5132	Fâneată		
Încl: 20° Exp: SE Alt: 580-660 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i> Acop. erbacee: 55%							
Gram: 68% (<i>Agrostis c.</i> 23%, <i>Arrhenatherum e.</i> 17%, <i>Festuca r.</i> 10%, <i>Brachypodium p.</i> 5%, <i>Briza m.</i> 5%, <i>Calamagrostis e.</i> 5%, <i>Phleum ph.</i> 3%)							
Leg: 7% (<i>Medicago f.</i> 3%, <i>Trifolium p.</i> 3%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 15% (<i>Daucus c.</i> 3%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Centaurea sp.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Achillea m.</i> 2%, <i>Cichorium i.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Hieracium p.</i> 1%, <i>Thymus m.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 10% (<i>Cirsium a.</i> 3%, <i>Carduus a.</i> 2%, <i>Dipsacus s.</i> 2%, <i>Juncus ef.</i> 2%, <i>Carlina a.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie Arbuști: Păducel, măceș, porumbar Gr. acop: 45% Răsp: mixt							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Rare exemplare de GO și ANN. Mușuroaie înierbate pe 2%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	22	52,3	F.P.	5132	Pășune		
Încl: 17° Exp: SE Alt: 600-760 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 80 %							
Gram: 70% (<i>Agrostis c.</i> 22%, <i>Festuca r.</i> 18%, <i>Nardus s.</i> 8%, <i>Deschampsia c.</i> 7%, <i>Calamagrostis e.</i> 5%, <i>Holcus l.</i> 5%, <i>Briza m.</i> 5%)							
Leg: 7% (<i>Trifolium r.</i> 4%, <i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 15% (<i>Achillea m.</i> 3%, <i>Daucus c.</i> 3%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Plantago m.</i> 2%, <i>Alchemilla v.</i> 1%, <i>Verbena of.</i> 1%, <i>Thymus m.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 8% (<i>Juncus sp.</i> 4%, <i>Cirsium sp.</i> 3%, <i>Carduus a.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie Arbuști: Păducel, măceș Gr. acop: 20% Răsp: mixt							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Rare exemplare de ME și ANN. Pe lângă pâraie, regenerare naturală de ANN, CA și ME de 50-60 ani. Mușuroaie înierbate pe 5%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	23A	59,5	F.P.	5132	Pășune		
Încl: 17° Exp: S Alt: 620-700 m Sol: brun eumezobazic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 90 %							
Gram: 75% (<i>Agrostis c.</i> 20%, <i>Festuca r.</i> 20%, <i>Deschampsia c.</i> 12%, <i>Nardus s.</i> 10%, <i>Briza m.</i> 5%, <i>Calamagrostis e.</i> 5%, <i>Holcus l.</i> 3%)							
Leg: 6% (<i>Trifolium r.</i> 2%, <i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%, <i>Medicago f.</i> 1%)							
Div. pl: 10% (<i>Achillea m.</i> 2%, <i>Centaurea sp.</i> 2%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%, <i>Thymus m.</i> 1%, <i>Fragaria v.</i> 1%,							
Pl. dăunăt. – toxice: 9% (<i>Juncus ef.</i> 4%, <i>Cirsium a.</i> 2%, <i>Ranunculus a.</i> 2%, <i>Carduus a.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie Arbuști: Păducel și măceș Gr. acop: 10% Răsp: mixt							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Rare exemplare bătrâne de GO, ME, CA și ANN. Mușuroaie înierbate pe 10%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant inferior	Config. ondulat
1	23B	12,5	P.P.	5132	Pășune împădurită		
Încl: 17° Exp: S Alt: 600-650 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: Acop. erbacee: %							
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past: Arbuști: Alun, păducel Gr. acop: 20% Răsp: uniform							
Veget. forest: 8CA 1ST 1ANN Vârsta: 30 ani Consist: 0,8 Răsp: mixt Volum: 1846 mc							
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							


Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	24A	43,4	F.P.	5132	Pășune		
Încl: 15° Exp: N Alt: 620 - 680 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Deschampsia caespitosa</i> Acop. erbacee: 90 %							
Gram: 70% (<i>Agrostis c.</i> 30%, <i>Deschampsia c.</i> 15%, <i>Agrostis s.</i> 10%, <i>Festuca r.</i> 10%, <i>Calamagrostis e.</i> 5%)							
Leg: 5% (<i>Trifolium r.</i> 3%, <i>Trifolium p.</i> 2%)							
Div. pl: 14% (<i>Carex sp.</i> 4%, <i>Alchemilla v.</i> 2%, <i>Achillea m.</i> 2%, <i>Filipendula h.</i> 2%, <i>Plantago m.</i> 2%, <i>Cichorium i.</i> 1%, <i>Galium v.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 11% (<i>Juncus ef.</i> 5%, <i>Juncus c.</i> 2%, <i>Ranunculus a.</i> 2%, <i>Cirsium sp.</i> 2%)							
Val. past: Bună Arbuști: Păducel și măceș Gr. acop: 10% Răsp: mixt							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Pe lângă pâraie, regenerare naturală de ANN, ME și CA de 40-50 ani.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant inferior	Config. ondulat
1	24B	8,8	P.P.	5232	Pășune împădurită		
Încl: 20º(10-25)		Exp: NE		Alt: 630 m	Sol: brun luvic tipic		
Date staț. suplim:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:	Gr. acop:	Răsp:			
Veget. forest:		4CA 2ME 2ANN 1PLT	Vârsta: 40 ani	Consist: 0,9	Răsp:	Volum: 1620 mc	
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	25A	46,6	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 20°		Exp: SE		Alt: 580-680 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 75 %			
Gram: 66% (<i>Agrostis c.</i> 25%, <i>Festuca r.</i> 20%, <i>Calamagrostis e.</i> 6%, <i>Cynosurus c.</i> 6%, <i>Brachypodium p.</i> 5%, <i>Anthoxanthum o.</i> 2%, <i>Briza m.</i> 2%)							
Leg: 6% (<i>Trifolium r.</i> 3%, <i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 18% (<i>Achillea m.</i> 4%, <i>Plantago l.</i> 2%, <i>Centaurea sp.</i> 2%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Cichorium i.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Filipendula h.</i> 2%, <i>Potentilla sp.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 10% (<i>Carduus a.</i> 3%, <i>Pteridium a.</i> 2%, <i>Juncus ef.</i> 2%, <i>Hypericum p.</i> 2%, <i>Disacus s.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști: Păducel și măceș		Gr. acop: 25%		Răsp: mixt	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Rare exemplare bătrâne de FA, CA și ME. Mușuroaie înierbate pe 10%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							


Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant inferior	Config. ondulat
1	25B	30,4	P.P.	5232	Pășune		
Încl: 20°		Exp: NV		Alt: 600-660 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest:		4CA 2ANN 2ME 1PLT		Vârsta: 50 ani		Consist: 0,7 Răsp: mixt Volum:	
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant superior	Config. ondulat
1	25C	9,7	P.P.	5232	Fâneață împădurită		
Încl: 20º		Exp: V		Alt: 600-680 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. supliment:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest: 3CA 2ME 2ANN 1FA 1JU 1PLT Vârsta: 50 ani Consist: 0,8 Răsp: mixt Volum: 1939 mc							
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	26A	66,4	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 17°(10-20)		Exp: NE		Alt: 580-740 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. supliment:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 85 %			
Gram: 63% (<i>Agrostis c.</i> 20%, <i>Festuca r.</i> 18%, <i>Arrhenatherum e.</i> 8%, <i>Cynesurus c.</i> 6%, <i>Calamagrostis e.</i> 6%, <i>Holcus l.</i> 3%, <i>Poa p.</i> 2%)							
Leg: 7% (<i>Trifolium r.</i> 3%, <i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Medicago f.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%, <i>Latyrus p.</i>)							
Div. pl: 18% (<i>Centaurea sp.</i> 4%, <i>Daucus c.</i> 4%, <i>Cichorium i.</i> 2%, <i>Achillea m.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Galium v.</i> 1%, <i>Potentilla sp.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 12% (<i>Urtica d.</i> 5%, <i>Carduus a.</i> 3%, <i>Pteridium a.</i> 2%, <i>Cirsium sp.</i> 2%)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști: Păducel, măceș, porumbar			Gr. acop: 15%		Răsp: mixt
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp:	Volum:
Date compl: Mușuroaie înierbate pe 5%. Rare exemplare bătrâne de GO, ME și CA.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							


Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	26B	18,6	P.P.	5232	Fâneată împădurită		
Încl: 20°		Exp: NE		Alt: 620-720 m		Sol: brun luvic tipic	
Date staț. supliment:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest: 4CA 2FA 2ANN 1ME 1JU		Vârsta: 50 ani		Consist: 0,8		Răsp: mixt Volum: 3301 mc	
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	27A	66,9	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 17 ^o Exp: NV Alt: 570 - 700 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i> Acop. erbacee: 95%							
Gram: 70% (<i>Agrostis c.</i> 25%, <i>Arrhenatherum e.</i> 15%, <i>Festuca r.</i> 10%, <i>Dactylis g.</i> 8%, <i>Brachypodium p.</i> 7%, <i>Phleum ph.</i> 3%, <i>Briza m.</i> 2%)							
Leg: 8% (<i>Trifolium p.</i> 4%, <i>Trifolium r.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%, <i>Medicago f.</i> 1%)							
Div. pl: 15% (<i>Dancus c.</i> 3%, <i>Gslum v.</i> 3%, <i>Achillea m.</i> 2%, <i>Cichorium i.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Potentilla sp.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Filipendula h.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 7% (<i>Carduus a.</i> 3%, <i>Urtica d.</i> 2%, <i>Hypericum p.</i> 1%, <i>Cirsium a.</i> 1%)							
Val. past: Bună Arbuști: Păducel, măceș Gr. acop: 5% Răsp: mixt							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Pe limita cu parcela 28, regenerare naturală de CA, FA, ME de 40-50 ani (o fâșie). Mușuroaie înierbate pe 10%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	27B	33,0	P.P.	5132	Fâneată împădurită		
Încl: 25 ^o Exp: NV Alt: 560-680m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: Acop. erbacee: %							
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past: Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum: 5570 mc							
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							


Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	28A	26,7	F.P.	5132	Fâneată		
Încl: 17 ^o Exp: NV Alt: 610 -670 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i> Acop. erbacee: 100 %							
Gram: 75% (<i>Agrostis c.</i> 22%, <i>Arrhenatherum e.</i> 18%, <i>Festuca r.</i> 15%, <i>Dactylis g.</i> 5%, <i>Lolium p.</i> 5%, <i>Deschampsia c.</i> 5%, <i>Briza m.</i> 5%)							
Leg: 10% (<i>Trifolium p.</i> 5%, <i>Medicago f.</i> 2%, <i>Vicia v.</i> 1%, <i>Trifolium r.</i> 1%, <i>Lathyrus p.</i> 1%)							
Div. pl: 12% (<i>Achillea m.</i> 3%, <i>Centaurea sp.</i> 2%, <i>Daucus c.</i> 2%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Filipendula h.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 3% (<i>Carlina a.</i> 1%, <i>Cirsium sp.</i> 1%, <i>Ranunculus c.</i> 1%)							
Val. past: Bună Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	28B	15,0	P.P.	5132	Fâneată împădurită		
Încl: 25° Exp: NV Alt: 600 – 690 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: Acop. erbacee: %							
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past: Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: 5CA 2FA 1GO 1ME 1ANN Vârsta: 60 ani Consist: 0,8 Răsp: uniform Volum: 2307 mc							
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	29A	37,4	F.P.	5132	Fâneată		
Încl: 15° Exp: NV Alt: 630 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Arrhenatherum elatius</i> – <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 97 %							
Gram: 77% (<i>Arrhenatherum e.</i> 30%, <i>Festuca r.</i> 20%, <i>Agrostis c.</i> 10%, <i>Dactylis g.</i> 7%, <i>Lolium p.</i> 4%, <i>Holcus l.</i> 3%, <i>Cynosurus c.</i> 3%)							
Leg: 10% (<i>Trifolium p.</i> 4%, <i>Medicago f.</i> 3%, <i>Lathyrus p.</i> 2%, <i>Trifolium r.</i> 1%)							
Div. pl: 10% (<i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Daucus c.</i> 2%, <i>Achillea m.</i> 1%, <i>Galium v.</i> 1%, <i>Potentilla a.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Cichorium i.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 3% (<i>Dipsacus s.</i> 1%, <i>Carlina a.</i> 1%, <i>Cirsium sp.</i> 1%)							
Val. past: Bună Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Regenerare naturală de ME de 5-10 ani pe 3%. Mușuroaie înierbate pe 5%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 ani. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	29B	22,6	P.P.	5132	Fâneată împădurită	versant inferior	ondulat
Încl: 25° Exp: N Alt: 560 – 620 m Sol: brun luvic litic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: Acop. erbacee: %							
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past: Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum: 3801 mc							
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	30	20,5	F.P.	5132	Fâneată		
Încl: 23 ^o Exp: E Alt: 630-700 m Sol: brun luvic litic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 95 %							
Gram: 70% (<i>Agrostis c.</i> 30%, <i>Festuca r.</i> 17%, <i>Arrhenatherum e.</i> 12%, <i>Deschampsia c.</i> 5%, <i>Calamagrostis e.</i> 3%, <i>Dactylis g.</i> 3%)							
Leg: 7% (<i>Trifolium p.</i> 3%, <i>Medicago f.</i> 2%, <i>Trifolium r.</i> 1%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 16% (<i>Centaurea sp.</i> 5%, <i>Daucus c.</i> 3%, <i>Achillea m.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Thymus m.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Hieracium p.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 7% (<i>Dipsacus s.</i> 3%, <i>Cirsium sp.</i> 2%, <i>Hypericum p.</i> 1%, <i>Carlina a.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie Arbuști: Păducel, măceș Gr. acop: 5% Răsp: mixt							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Rare exemplare bătrâne de CA, ST și ME. În u.a. o adăpătoare. Pe lângă pâraie; regenerare naturală de ANN și SAP.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	31	43,6	F.P.	5132	Fâneată		
Încl: 20 ^o Exp: SEA Alt: 570 – 700 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 90 %							
Gram: 73% (<i>Agrostis c.</i> 30%, <i>Festuca r.</i> 18%, <i>Arrhenatherum e.</i> 12%, <i>Calamagrostis e.</i> 5%, <i>Deschampsia c.</i> 2%, <i>Briza m.</i> %)							
Leg: 5% (<i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Medicago f.</i> 2%, <i>Trifolium r.</i> 1%)							
Div. pl: 18% (<i>Daucus c.</i> 8%, <i>Achillea m.</i> 3%, <i>Filipandula h.</i> 1%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Plantago l.</i> 2%, <i>Potentilla sp.</i> 1%, <i>Thymus m.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 4%							
Val. past: Bună Arbuști: Măceș, păducel Gr. acop: 10% Răsp: mixt							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Regenerare naturală de ANN, GO, CA, SAP pe lângă pârau.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							


Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	32	46,4	F.P.	5132	Fâneată		
Încl: 23 ^o Exp: S Alt: 580-700 m Sol: brun luvic litic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 92%							
Gram: 69% (<i>Agrostis c.</i> 30%, <i>Festuca r.</i> 16%, <i>Calamagrostis e.</i> 8%, <i>Arrhenatherum e.</i> 7%, <i>Holcus l.</i> 3%, <i>Deschampsia c.</i> 3%, <i>Briza m.</i> 2%)							
Leg: 5% (<i>Medicago f.</i> 2%, <i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%, <i>Vicia v.</i> 1%)							
Div. pl: 18% (<i>Achillea m.</i> 4%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Galium v.</i> 3%, <i>Plantago l.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%, <i>Corex sp.</i> 2%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 8% (<i>Pteridium a.</i> 3%, <i>Cirsium a.</i> 2%, <i>Carduus a.</i> 2%, <i>Ranunculus a.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie Arbuști: Păducel, măceș Gr. acop: 8% Răsp: mixt							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Pe lângă pârau regenerare de ANN, SAP de 40-50 de ani. Mușuroaie înierbate pe 10%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	33	53,4	F.P.	5132	Fâneată		
Încl: 20° Exp: S Alt: 580-700 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i> Acop. erbacee: 90 %							
Gram: 70% (<i>Agrostis c.</i> 20%, <i>Arrhenatherum e.</i> 15%, <i>Festuca r.</i> 15%, <i>Dactylis g.</i> 6%, <i>Brachypodium p.</i> 6%, <i>Calamagrostis e.</i> 5%, <i>Cynosurus c.</i> 3%)							
Leg: 8% (<i>Medicago f.</i> 3%, <i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%, <i>Trifolium r.</i> 2%)							
Div. pl: 15% (<i>Daucus c.</i> 4%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Cichorium i.</i> 1%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 1%, <i>Achillea m.</i> 2%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Potentilla sp.</i> 1%)							
Pl. dăunăt.-toxice: 7% (<i>Dipsacus s.</i> 3%, <i>Juncus ef.</i> 1%, <i>Cirsium a.</i> 1%, <i>Ranunculus c.</i> 2%)							
Val. past: Bună Arbuști: Păducel, măceș Gr. acop: 10% Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Pe lângă părau (limita cu 36A) regenerare naturală de ANN, SAP, CA, JU de 40-50 de ani. Mușuroaie pe 5%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
3	34A	65,7	F.P.	5232	Pășune		
Încl: 20°(10-25) Exp: NVAIt: 870 - 920m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Agrostis capillaris</i> Acop. erbacee: 100%							
Gram: 70% (<i>Festuca r.</i> 20%, <i>Agrostis c.</i> 20%, <i>Deschampsia c.</i> 17%, <i>Calamagrostis e.</i> 5%, <i>Lolium p.</i> 3%, <i>Nardus s.</i> 3%, <i>Holcus l.</i> 1%, <i>Cynosurus c.</i> 1%)							
Leg: 8% (<i>Trifolium r.</i> 5%, <i>Trifolium p.</i> 3%, <i>Lotus c.</i> +)							
Div. pl: 11% (<i>Achillea m.</i> 4%, <i>Plantago sp.</i> 2%, <i>Taraxacum of.</i> 1%, <i>Verbena of.</i> 1%, <i>Daucus c.</i> 1%, <i>Fragaria v.</i> 1%, <i>Thymus m.</i> 1%, <i>Verbascum of.</i> +, <i>Agrimonia e.</i> +)							
Pl. dăunăt. – toxice: 11% (<i>Carduus a.</i> 5%, <i>Urtica d.</i> 3%, <i>Cirsium a.</i> 2%, <i>Juncus e.</i> 2%, <i>Mentha sp.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Rare exemplare bătrâne de FA, CA. Mușuroaie înierbate pe 10%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant superior	Config. ondulat
3	34B	12,1	F.P.	5232	Pășune		
Încl: 20° Exp: NV Alt: 850 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Calamagrostis epigeios</i> Acop. erbacee: 45 %							
Gram: 85% (<i>Calamagrostis e.</i> 55%, <i>Deschampsia c.</i> 15%, <i>Agrostis c.</i> 8%, <i>Festuca r.</i> 7%)							
Leg: 3% (<i>Trifolium r.</i> 2%, <i>Trifolium p.</i> 1%)							
Div. pl: 7% (<i>Achillea m.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Plantago sp.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Galium v.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 5% (<i>Urtica d.</i> 3%, <i>Carduus m.</i> 1%, <i>Cirsium a.</i> 1%)							
Val. past: Foarte slabă Arbuști: Măceș, păducel Gr. acop: 5% Răsp: mixt							
Veget. forest: 9FA1CA Vârsta: 100 ani Consist: 0,1 Răsp: mixt Volum:							
Date compl: Regenerare naturală de ME, CA de 5-10 ani pe 0,4S. Mușuroaie înierbate pe 1%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 de ani și a vegetației arbustive. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief	Config.
3	34C	5,4	P.P.	5232	Pășune împădurită	versant mijlociu	ondulat
Încl: 20°		Exp: NV		Alt: 920 m		Sol: Brun eumezobazic tipic	
Date stat. suplimentare:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunător - toxice:							
Val. past:		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest: 9FA1ME		Vârsta: 120 ani		Consist: 0,6		Răsp: Volum: 1160 mc	
Date complet:							
Lucr. executat:							
Lucr. propus:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
4	35	27,9	F.P.	5232	Pășune		
Încl: 20°		Exp: NVAIt: 880 - 960 m		Sol: Brun eumezobazic tipic			
Date stat. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Calamagrostis epigeios</i> Acop. erbacee: 75 %							
Gram: 75% (<i>Agrostis c.</i> 28%, <i>Calamagrostis e.</i> 17%, <i>Festuca r.</i> 15%, <i>Deschampsia c.</i> 10%, <i>Holcus l.</i> 2%, <i>Nardus s.</i> 2%, <i>Cynosurus c.</i> 1%)							
Leg: 7% (<i>Trifolium r.</i> 5%, <i>Trifolium p.</i> 1%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 10% (<i>Achillea m.</i> 3%, <i>Thymus m.</i> 2%, <i>Carex sp.</i> 1%, <i>Plantago sp.</i> 1%, <i>Centaurea sp.</i> 1%, <i>Daucus c.</i> 1%, <i>Fragaria v.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 8% (<i>Cirsium a.</i> 3%, <i>Mentha sp.</i> 2%, <i>Juncus e.</i> 2%, <i>Urtica d.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști: <i>Ienupăr</i> , <i>măceș</i>		Gr. acop: 5%		Răsp:	
Veget. forest: 10FA		Vârsta: 120 ani		Consist: 0,1		Răsp: uniform Volum:	
Date compl: Regenerare naturală de ME, CA, FA de 5 ani pe 0,1S.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 de ani și a vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							


Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	36A	53,2	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 20°		Exp: NV		Alt: 580-700 m		Sol: brun luvic tipic	
Date stat. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i> Acop. erbacee: 80 %							
Gram: 68% (<i>Agrostis</i> c. 22%, <i>Arrhenatherum</i> e. 20%, <i>Festuca</i> r. 15%, <i>Brachypodium</i> p. 5%, <i>Dactylis</i> g. 3%, <i>Phleum</i> p. 2%, <i>Briza</i> m. 1%)							
Leg: 6% (<i>Trifolium</i> p. 3%, <i>Lotus</i> c. 1%, <i>Medicago</i> f. 1%, <i>Vicia</i> v. 1%)							
Div. pl: 18% (<i>Centaurea</i> sp. 4%, <i>Galium</i> v. 2%, <i>Daucus</i> c. 3%, <i>Thymus</i> m. 3%, <i>Achillea</i> m. 2%, <i>Fragaria</i> v. 2%, <i>Agrimonia</i> e. 1%, <i>Plantago</i> l. 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 8% (<i>Carduus</i> a. 4%, <i>Dipsacus</i> s. 3%, <i>Hypericum</i> p. 1%, <i>Cirsium</i> sp. +)							
Val. past: Bună		Arbuști: Păducel, măceș		Gr. acop: 15%		Răsp: mixt	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Regenerare naturală de ME, CA, SAC de 10-15 ani pe 5%. Mușuroaie înierbate pe 10%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 de ani și a vegetației arbustive. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	36B	21,0	P.P.	5232	Fâneată împădurită		
Încl: 20° Exp: NAlt: 610 - 690 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: Acop. erbacee: %							
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past: Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: 6ANN2CA1SAP1JU Vârsta: Consist: Răsp: Volum: 3464 mc							
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	37	94,6	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 17° Exp: NV Alt: 560 - 700 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i> Acop. erbacee: 75 %							
Gram: 74% (<i>Agrostis c.</i> 33%, <i>Arrhenatherum e.</i> 20%, <i>Festuca r.</i> 10%, <i>Dactylis g.</i> 5%, <i>Phleum ph.</i> 2%, <i>Briza m.</i> 2%, <i>Brachypodium p.</i> 2%)							
Leg: 7% (<i>Trifolium p.</i> 3%, <i>Trifolium r.</i> 2%, <i>Medicago f.</i> 1%, <i>Vicia v.</i> 1%)							
Div. pl: 14% (<i>Daucus c.</i> 5%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Cichorium i.</i> 2%, <i>Achillea m.</i> 1%, <i>Filipendula h.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Centaurea sp.</i> 1%,)							
Pl. dăunăt. – toxice: 5% (<i>Carduus a.</i> 2%, <i>Dipsacus s.</i> 2%, <i>Hypericum p.</i> 1%, <i>Carlina v. +</i>)							
Val. past: Bună Arbuști: Păducel, măceș Gr. acop: 20% Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Regenerare naturală de ME, SA, PR de 10-15 ani pe 5%. Pe lângă pâraie regenerare naturală de ANN, CA de 60-70 de ani. Rare exemplare bătrâne de GO.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	38A	46,3	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 23°(15-25) Exp: SV Alt: 560-680 m Sol: brun luvic litic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 80 %							
Gram: 68% (<i>Agrostis c.</i> 20%, <i>Festuca r.</i> 15%, <i>Brachypodium p.</i> 10%, <i>Arrhenatherum e.</i> 8%, <i>Dactylis g.</i> 5%, <i>Briza m.</i> 5%, <i>Calamagrostis e.</i> 5%)							
Leg: 5% (<i>Trifolium p.</i> 3%, <i>Medicago f.</i> 1%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 17% (<i>Centaurea sp.</i> 5%, <i>Daucus c.</i> 3%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Achillea m.</i> 2%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Plantago m.</i> 1%, <i>Thymus m.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 10% (<i>Carduus a.</i> 3%, <i>Dipsacus s.</i> 3%, <i>Cirsium a.</i> 2%, <i>Ranunculus c.</i> 1%, <i>Hypericum p.</i> 1%)							
Val. past: Mijlocie Arbuști: Măceș, păducel Gr. acop: 20% Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Rare exemplare de GO, CA, ME. Pe lângă pârau regenerare naturală de ANN, SAP. Mușuroaie înierbate pe 10%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distragerea și nivelarea mușuroaielor. Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	38B	16,9	P.P.	5132	Fâneată împădurită		
Încl: 25° Exp: NV Alt: 600 - 700 m Sol: brun luvic litic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: Acop. erbacee: %							
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past: Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: 4CA2GO2ME1FA1JU Vârsta: 35 ani Consist: 0,9 Răsp: Volum: 1775 mc							
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Versant	Config. ondulat
1	39	35,0	F.P.	5132	Fâneată		
Încl: 17° Exp: NV Alt: 590 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 90 %							
Gram: 70% (<i>Agrostis c.</i> 20%, <i>Festuca r.</i> 20%, <i>Arrhenatherum e.</i> 16%, <i>Brachypodium p.</i> 8%, <i>Poa p.</i> 3%, <i>Cynosurus c.</i> 2%, <i>Briza m.</i> 1%)							
Leg: 8% (<i>Trifolium r.</i> 5%, <i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 15% (<i>Achillea m.</i> 3%, <i>Thymus m.</i> 3%, <i>Taraxacum of.</i> 2%, <i>Centaurea sp.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Galium v.</i> 1%, <i>Plantago m.</i> 1%, <i>Daucus c.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 7% (<i>Cirsium a.</i> 3%, <i>Dipsacus s.</i> 2%, <i>Ranunculus c.</i> 1%, <i>Colchicum a.</i> 1%)							
Val. past: Bună Arbuști: Măceș, păducel Gr. acop: 10% Răsp: mixt							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Regenerare naturală de ANN, JU, GO, CA de 40-50 de ani pe lângă pâraie.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Luncă înaltă	Config. plană
1	40	55,1	F.P.	5132	Fâneată		
Încl: 5° Exp: S Alt: 540 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Arrhenatherum elatius</i> – <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 100%							
Gram: 55% (<i>Arrhenatherum e.</i> 20%, <i>Festuca r.</i> 12%, <i>Agrostis s.</i> 10%, <i>Agrostis c.</i> 5%, <i>Dactylis g.</i> 5%, <i>Lolium p.</i> 3%)							
Leg: 30% (<i>Medicago s.</i> 25%, <i>Trifolium p.</i> 3%, <i>Medicago f.</i> 1%, <i>Trifolium r.</i> 1%)							
Div. pl: 10% (<i>Achillea m.</i> 3%, <i>Taraxacum of.</i> 2%, <i>Centaurea sp.</i> 2%, <i>Potentilla a.</i> 1%, <i>Alchemilla v.</i> 1%, <i>Plantago m.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 5% (<i>Ranunculus c.</i> 2%, <i>Rumex a.</i> 2%, <i>Cirsium sp.</i> 1%)							
Val. past: Foarte bună Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Pe lângă pâraie regenerare naturală de ANN.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	41	71,3	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 17 ⁹ (10-20) Exp: S Alt: 530 - 610 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Arrhenatherum elatius</i> – <i>Argrostis capillaris</i> Acop. erbacee: 95 %							
Gram: 70% (<i>Arrhenatherum e.</i> 30%, <i>Agrostis c.</i> 17%, <i>Dactylis g.</i> 15%, <i>Trisetum f.</i> 4%, <i>Festuca r.</i> 3%, <i>Phleum p.</i> 1%)							
Leg: 10% (<i>Medicago f.</i> 5%, <i>Trifolium p.</i> 3%, <i>Lotus c.</i> 1%, <i>Trifolium r.</i> 1%)							
Div. pl: 13% (<i>Achillea m.</i> 3%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Daucus c.</i> 2%, <i>Galium v.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Plantago m.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Fragaria v.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 7% (<i>Cirsium sp.</i> 2%, <i>Carduus a.</i> 2%, <i>Colchicum a.</i> 2%, <i>Dipsacus s.</i> 1%)							
Val. past: Bună Arbuști: Păducel, măceș Gr. acop: 3% Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Rare exemplare de GO, PR, CA. Pe lizieră regenerare naturală de CA de 5-10 ani pe 2%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 de ani și a vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant	Config. ondulat
1	42	67,5	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 15 ⁹ Exp: S Alt: 500 - 570 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Arrhenatherum elatius</i> – <i>Dactylis glomerata</i> Acop. erbacee: 99 %							
Gram: 65% (<i>Arrhenatherum e.</i> 30%, <i>Dactylis g.</i> 18%, <i>Agrostis c.</i> 7%, <i>Festuca r.</i> 5%, <i>Trisetum f.</i> 3%, <i>Holcus l.</i> 2%)							
Leg: 12% (<i>Medicago f.</i> 5%, <i>Trifolium p.</i> 5%, <i>Trifolium r.</i> 1%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 15% (<i>Centaurea sp.</i> 4%, <i>Daucus c.</i> 3%, <i>Achillea m.</i> 2%, <i>Plantago sp.</i> 2%, <i>Galium v.</i> 1%, <i>Galium s.</i> 1%, <i>Cichorium i.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 8% (<i>Cirsium sp.</i> 3%, <i>Colchicum a.</i> 3%, <i>Hypericum p.</i> 1%, <i>Dipsacus s.</i> 1%)							
Val. past: Bună Arbuști: Păducel, măceș Gr. acop: 1% Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Mici păcuri cu regenerare de SAC de 5-10 ani							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Versant	Config. ondulat
1	43	52,3	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 15 ⁹ (5-20)Exp: S Alt: 500 - 560 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i> Acop. erbacee: 100%							
Gram: 65% (<i>Festuca r.</i> 30%, <i>Arrhenatherum e.</i> 20%, <i>Dactylis g.</i> 11%, <i>Agrostis c.</i> 3%, <i>Trisetum f.</i> 1%)							
Leg: 13% (<i>Medicago f.</i> 5%, <i>Trifolium p.</i> 3%, <i>Lathyrus p.</i> 2%, <i>Trifolium r.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%)							
Div. pl: 16% (<i>Daucus c.</i> 4%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Plantago l.</i> 2%, <i>Filipendula h.</i> 2%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Achillea m.</i> 1%, <i>Galium v.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 6% (<i>Cirsium sp.</i> 4%, <i>Rumex a.</i> 1%, <i>Colchicum a.</i> 1%)							
Val. past: Bună Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Pe lângă părau regenerare naturală de SAP, PLT.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Versant	Config. ondulat
1	44A	102,0	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 17°(10-20) Exp: V Alt: 480-560 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i> Acop. erbacee: 80%							
Gram: 73% (<i>Festuca r.</i> 30%, <i>Arrhenatherum e.</i> 20%, <i>Agrostis c.</i> 10%, <i>Lolium p.</i> 8%, <i>Agropyron r.</i> 2%, <i>Holcus l.</i> 2%, <i>Poa p.</i> 1%)							
Leg: 5% (<i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Medicago f.</i> 1%, <i>Lotus c.</i> 1%, <i>Trifolium r.</i> 1%)							
Div. pl: 15% (<i>Achillea l.</i> 3%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Fragaris v.</i> 2%, <i>Thymus m.</i> 2%, <i>Daucus c.</i> 2%, <i>Hieracium p.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Taraxacum of.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 7% (<i>Dipsacus s.</i> 4%, <i>Cirsium a.</i> 2%, <i>Carduus a.</i> 1%)							
Val. past: Bună Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: În u.a. pe aproximativ 20 ha o fermă de bizoni. Mușuroaie înierbate pe 2%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant mijlociu	Config. ondulat
1	44B	3,5	F.P.	5232	Fâneată împădurită		
Încl: 20° Exp: N Alt: 480 - 560 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: Acop. erbacee: %							
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past: Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: 10SC Vârsta: 40 ani Consist: 0,7 Răsp: mixt Volum: 436 mc							
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Versant	Config. ondulat
1	45	39,6	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 10°(5-15) Exp: S Alt: 500m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Arrhenatherum elatius</i> – <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 100%							
Gram: 70% (<i>Arrhenatherum e.</i> 35%, <i>Festuca r.</i> 13%, <i>Agrostis c.</i> 10%, <i>Dactylis g.</i> 10%, <i>Trisetum f.</i> 2%, <i>Poa p.</i>)							
Leg: 15% (<i>Medicago f.</i> 6%, <i>Lathyrus p.</i> 4%, <i>Trifolium p.</i> 2%, <i>Vicia v.</i> 1%, <i>Trifolium r.</i> 1%)							
Div. pl: 12% (<i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Daucus c.</i> 3%, <i>Plantago m.</i> 1%, <i>Achillea m.</i> 1%, <i>Agrimonia e.</i> 1%, <i>Filipendula h.</i> 1%, <i>Potentilla sp.</i> 1%, <i>Leucanthemum v.</i> 1%, <i>Cichorium i.</i>)							
Pl. dăunăt. – toxice: 3% (<i>Cirsium sp.</i> 2%, <i>Colchicum a.</i> 1%, <i>Artemisia ab.</i>)							
Val. past: Bună Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Versant	Config. ondulat
1	46A	96,9	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 15° Exp: S Alt: 480 - 550 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Arrhenatherum elatius</i> – <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 98 %							
Gram: 72% (<i>Arrhenatherum e.</i> 29%, <i>Festuca r.</i> 20%, <i>Dactylis g.</i> 10%, <i>Agrostis c.</i> 8%, <i>Trisetum f.</i> 2%, <i>Deschampsia c.</i> 2%, <i>Calamagrostis e.</i> 1%)							
Leg: 10% (<i>Medicago f.</i> 3%, <i>Trifolium p.</i> 3%, <i>Lathyrus p.</i> 2%, <i>Lotus c.</i> 1%, <i>Vicia c.</i> 1%)							
Div. pl: 14% (<i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Daucus c.</i> 3%, <i>Filipendula h.</i> 2%, <i>Achillea m.</i> 2%, <i>Cichorium i.</i> 1%, <i>Leucanthemum v.</i> 1%, <i>Potentilla a.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 4% (<i>Dipsacus s.</i> 2%, <i>Cirsium sp.</i> 1%, <i>Carlina a.</i> 1%)							
Val. past: Bună Arbuști: Măces, păducel Gr. acop: 1% Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Regenerare naturală de SAC de 10-20 ani pe 1%. Mușuroaie înierbate pe 1%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 de ani și a vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant mijlociu	Config. ondulat
1	46B	7,8	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 20° Exp: V Alt: 490 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i> Acop. erbacee: 70 %							
Gram: 70% (<i>Festuca r.</i> 25%, <i>Arrhenatherum e.</i> 20%, <i>Agrostis c.</i> 13%, <i>Dactylis c.</i> 13%, <i>Phleum p.</i> 1%, <i>Poa p.</i> 1%)							
Leg: 5% (<i>Medicago f.</i> 2%, <i>Trifolium p.</i> 1%, <i>Lathyrus p.</i> 1%, <i>Trifolium r.</i> 1%, <i>Lotus c.</i>)							
Div. pl: 17% (<i>Cichorium i.</i> 4%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Daucus c.</i> 2%, <i>Galium v.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Plantago l.</i> 2%, <i>Achillea m.</i> 1%, <i>Filipendula h.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 8% (<i>Carduus a.</i> 4%, <i>Cirsium sp.</i> 2%, <i>Hypericum sp.</i> 1%, <i>Colchicum a.</i> 1%)							
Val. past: Bună Arbuști: Păducel, măceș Gr. acop: 3% Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Livadă de măr și prun cu consistența 0,3.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							


Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant inferior	Config. ondulat
1	46C	0,5	P.P.	5232	Fâneată împădurită		
Încl: 25° Exp: SV Alt: 500 m Sol: brun luvic litic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: Acop. erbacee: %							
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past: Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: 10SC Vârsta: 20 ani Consist: 0,8 Răsp: uniform Volum: 53 mc							
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Versant	Config. ondulat
1	47	83,0	F.P.	5232	Fâneată		
Încl: 20° Exp: SE Alt: 520 - 630 m Sol: brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i> Acop. erbacee: 95 %							
Gram: 68% (<i>Festuca r.</i> 20%, <i>Arrhenatherum e.</i> 18%, <i>Agrostis c.</i> 10%, <i>Dactylis g.</i> 6%, <i>Calamagrostis e.</i> 6%, <i>Phleum p.</i> 5%, <i>Poa p.</i> 2%, <i>Briza m.</i> 1%)							
Leg: 8% (<i>Medicago f.</i> 3%, <i>Trifolium p.</i> 3%, <i>Lotus c.</i> 1%, <i>Trifolium r.</i> 1%, <i>Lathyrus p.</i> 1%)							
Div. pl: 14% (<i>Daucus c.</i> 3%, <i>Centaurea sp.</i> 3%, <i>Achillea m.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%, <i>Filipendula h.</i> 1%, <i>Cichorium i.</i> 1%, <i>Plantago l.</i> 1%, <i>Potentilla sp.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 10% (<i>Dipsacus s.</i> 4%, <i>Cirsium a.</i> 3%, <i>Artemisia a.</i> 1%, <i>Carduus a.</i> 1%, <i>Hypericum p.</i> 1%)							
Val. past: Bună Arbuști: <i>Păducel</i> , <i>măceș</i> Gr. acop: 5% Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Pajiște parțial incendiată. Mușuroaie înierbate pe 10%. Pe lângă pârâu regenerare naturală de SAP, ANN, JU de 50-60 de ani.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației arbustive. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Luncă	Config. Plană
1	48A	0,9	F.P.	5152	Pășune		
Încl: 5° Exp: S Alt: 470m Sol: Brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 90%							
Gram: 70% (<i>Festuca r.</i> 50%, <i>Lolium p.</i> 15%, <i>Agrostis c.</i> 5%)							
Leg: 10% (<i>Trifolium r.</i>)							
Div. pl: 12% (<i>Teraxacum of.</i> 3%, <i>Achillea m.</i> 3%, <i>Alchemila v.</i> 3%, <i>Plantago sp.</i> 3%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 8% (<i>Urtica d.</i> 3%, <i>Deschampsia c.</i> 3%, <i>Carduus a.</i> 2%)							
Val. past: Mijlocie Arbuști: <i>Măceș</i> , <i>Soc</i> , <i>Alun</i> Gr. acop: 10% Răsp: mixt							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl:							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea arbuștilor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămânțat. Fertilizări.							


Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Luncă	Config. Plană
1	48B	11,8	F.P.	5152	Pășune		
Încl: 5° Exp: SE Alt: 500 m Sol: Brun luvic tipic							
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> Acop. erbacee: 100 %							
Gram: 75% (<i>Festuca r.</i> 50%, <i>Agrostis c.</i> 10%, <i>Nardus s.</i> 10%, <i>Poa sp.</i> 5%)							
Leg: 5% (<i>Trifolium sp.</i>)							
Div. pl: 12% (<i>Achillea m.</i> 4%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Taraxacum of.</i> 3%, <i>Achillea v.</i> 2%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 8% (<i>Deschampsia c.</i> 4%, <i>Urtica d.</i> 2%, <i>Carduus a.</i> 2%)							
Val. past: Mijlocie Arbuști: Gr. acop: Răsp:							
Veget. forest: Vârsta: Consist: Răsp: Volum:							
Date compl: Mușuroaie pe 2%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Luncă	Config. Plană
1	49A	3,5	F.P.	5152	Pășune		
Încl: 5º(3-10º)		Exp:NV		Alt: 520m		Sol: Brun luvic tipic	
Date staț. suplîm:							
Tip pajiște: <i>Trifolium pratense</i>				Acop. erbacee: 100 %			
Gram: 30% (<i>Festuca r.</i> 10%, <i>Lolium p.</i> 10% <i>Agrostis c.</i> 10%)							
Leg: 50% (<i>Trifolium p.</i>)							
Div. pl: 14% (<i>Teraxacum of.</i> 4%, <i>Achillea m.</i> 3%, <i>Alchemila v.</i> 4%, <i>Plantago sp.</i> 3%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 6% (<i>Deschampsia c.</i> 2%, <i>Urtica d.</i> 2%, <i>Carduus a.</i> 2%)							
Val. past: Bună		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Rare exemplare de salcie albă. Mușuroaie pe 2%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice.							
Supraînsămîntări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Luncă	Config. Plană
1	49B	1,5	F.P.	5152	Pășune cu arbori		
Încl: 3º		Exp: S		Alt: 500 m		Sol: Brun luvic tipic	
Date staț. suplîm:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 20 %			
Gram: 78%(<i>Festuca r.</i>)							
Leg: 2%(<i>Trifolium sp.</i>)							
Div. pl:10% (<i>Teraxacum of.</i> 2%, <i>Plantago m.</i> 3%, <i>Achillea m.</i> 2%, <i>Fragaria v.</i> 2%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 10% (<i>Urtica d.</i> 2%, <i>Carduus a.</i> 2%).							
Val. past: Foarte slabă		Arbuști: Soc, Sânger, Păducel		Gr. acop: 20%		Răsp: uniform	
Veget. forest: 10SA		Vârsta: 50		Consist: 0,3		Răsp: uniform Volum: 83 mc	
Date compl: Regenerarea de 5-10 ani de SC, SA, ANN / 0,3 S. Mușuroaie pe 2%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 ani și a abuştilor. Reducerea consistenței la 0,1. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămîntări. Fertilizări.							


Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant mijlociu	Config. ondulat
1	49C	1,1	P.P.	5152	Pășune împădurită		
Încl: 15º		Exp: NV		Alt: 530 m		Sol: Brun luvic tipic	
Date staț. suplîm:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:Păducel		Gr. acop: 20%		Răsp: mixt	
Veget. forest: 6CA 4JU		Vârsta: 80 ANI		Consist: 0,5		Răsp: mixt Volum: 137 mc	
Date compl: Variație vârste 40-140 ani. Rari preexistenți de GO. Diseminat TE, PAR. Mici goluri înierbate.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant mijlociu	Config. ondulat
1	49D	1,7	P.P.	5152	Pășune împădurită		
Încl: 15 ^o (10-30 ^o)		Exp: NV		Alt: 530 m		Sol: Brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:Păducel/Gr. acop: 20%			Răsp: mixt		
Veget. forest: 2GO 7CA 1JU		Vârsta: 100 ani		Consist: 0,5		Răsp:mixt	Volum: 234 mc
Date compl: Arboret provenit din lăstari de vitalitate foarte slabă.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant mijlociu	Config. ondulat
1	49E	2,1	P.P.	5152	Pășune împădurită		
Încl: 15º(10-20º)		Exp: NV		Alt: 530 m		Sol: Brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște:		Acop. erbacee: %					
Gram:							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past:		Arbuști:Păducel, Alun Gr. acop:20%			Răsp:mixt		
Veget. forest: 8CA 2GO		Vârsta:100 ani		Consist:0,5Răsp: uniform		Volum: 294 mc	
Date compl: Diseminat TE, JU							
Lucr. exec:							
Lucr. prop:							


Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Luncă	Config. Plană
1	49F	0,3	F.P.	5152	Pășune		
Încl: 3°		Exp: S		Alt: 500 m		Sol: Brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: Festuca rubra				Acop. erbacee: 20 %			
Gram: 80% (Festuca r. 60%, Agropyron c. 10%, Poa p. 10%)							
Leg: 5% (Trifolium sp.)							
Div. pl: 10% (Taraxacum of. 3%, Achillea m. 3%, Plantago sp. 2%, Fragaria v. 2%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 5% (Urtica d. 3%, Carduus a. 2%)							
Val. past: Slabă		Arbuști: Păducel, Alun		Gr. acop: 10%		Răsp: mixt	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Regenerarea de salcie albă de 10 (5-15 ani) pe 70%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrișarea vegetației forestiere ≤20 ani și a arbuștilor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămînțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant inferior	Config. ondulat
1	49G	17,8	F.P.	5152	Pășune		
Încl: 12 ⁹ (10-20 ⁹)		Exp: NV		Alt: 530 m		Sol: Brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Nardus s.</i>				Acop. erbacee: 90%			
Gram: 63% (<i>Festuca r.</i> 38%, <i>Nardus s.</i> 10%, <i>Agrostis c.</i> 10%, <i>Lolium p.</i> 5%)							
Leg: 7% (<i>Trifolium r.</i>)							
Div. pl: 15% (<i>Teraxacum of.</i> 3%, <i>Achillea m.</i> 2%, <i>Alchemila v.</i> 4%, <i>Fragaria v.</i> 3%, <i>Plantago sp</i> 3%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 15% (<i>Urtica s.</i> 3%, <i>Deschampsia c.</i> 10%, <i>Carduus a.</i> 2%)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști: Măceș, Păducel		Gr. acop: 10%		Răsp: mixt	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Spre parcela 2, mai mult trifoi. Mușuroi pe 1%. Rare exemplare de CA, SA, ANN. De-a lungul pârâului Aita, exemplare izolate de salcie albă.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Defrișarea arbuștilor. Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Supraînsămîntări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funct.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant mijlociu	Config. ondulat
1	49H	0,4	P.A.	5152	Pășune cu arbori		
Încl: 20 ⁹		Exp:NV		Alt: 550 m		Sol: Brun luvic tipic	
Date staț. suplim: Prin mijlocul u.a. un pârâu							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i>				Acop. erbacee: 20%			
Gram:100% (<i>Festuca r.</i>)							
Leg:							
Div. pl:							
Pl. dăunăt. – toxice:							
Val. past: Foarte slabă		Arbuști: <i>Păducel, Alun</i>		Gr. acop: 40%		Răsp: mixt	
Veget. forest: 10GO		Vârsta: 140 ani		Consist: 0,3		Răsp: uniform Volum: 30 mc	
Date compl: Regenerarea naturală de 10Go 3-5 ani / 10%							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Defrisarea vegetatiei forestiere ≤20 ani si a arbuștilor. Supraînsămîntări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief versant mijlociu	Config. ondulat
1	49I	18,2	F.P.	5152	Pășune		
Încl: 15°		Exp:NV		Alt: 550m		Sol: Brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Deschampsia caespitosa</i>				Acop. erbacee: 100 %			
Gram:15% (<i>Festuca r.</i> 10%, <i>Nardus s.</i> 5%)							
Leg:							
Div. pl:5% (<i>Alchemilla m.</i> 3%, <i>Fragaria v.</i> 1%, <i>Plantago sp.</i> 1%)							
Pl. dăunăt. – toxice:80% (<i>Deschampsia c.</i>)							
Val. past: Slabă		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Toată suprafața acoperită cu mușuroaie înierbate cu <i>Deschampsia</i> .							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Distrugerea si nivelarea musuroaielor. Reînsământări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Luncă	Config. Plan
5	50A	11,2	F.P.	5152	Pășune		
Încl: 3 ^o		Exp: S		Alt: 430 m		Sol: Brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Agrostis capillaris</i>				Acop. erbacee: 98%			
Gram: 72% (<i>Agrostis c.</i> 20%, <i>Festuca r.</i> 32%, <i>Poa p.</i> 5%, <i>Lolium p.</i> 10%, <i>Nardus s.</i> 5%)							
Leg: -10% (<i>Trifolium sp.</i>)							
Div. pl: 15% (<i>Achillea m.</i> 3%, <i>Taraxacum of.</i> 4%, <i>Alchemilla m.</i> 5%, <i>Plantago sp.</i> 3%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 3%							
Val. past: Bună		Arbuști: Măceș, Păducel		Gr. acop: 2%		Răsp: uniform	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Mușuroaie pe 1%.							
Lucr. exec: Administrat azotat de amoniu – 2014.							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Defrișarea arbuștilor. Supraînsămânțări. Fertilizări.							


Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Luncă	Config. Plană
5	50B	3,5	F.P.	5152	Pășune		
Încl: 3 ^o		Exp: S		Alt: 430m		Sol: Brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Agrostis capillaris</i> Acop. erbacee: 100%							
Gram: 80% (<i>Agrostis c.</i> 25%, <i>Festuca r.</i> 40%, <i>Nardus s.</i> 15%)							
Leg: 3% (<i>Trifolium r.</i>)							
Div. pl: 14% (<i>Achillea m.</i> 4%, <i>Plantago m.</i> 3%, <i>Taraxacum of.</i> 3%, <i>Alchemilla v.</i> 2%, <i>Thymus m.</i> 2%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 3% (<i>Carduus a.</i> 1%, <i>Urtica d.</i> 2%)							
Val. past: Mijlocie		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Mușuroaie pe 1%..							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Supraînsămânțări. Fertilizări.							

Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. relief Luncă	Config. Plană
5	51	33,8	F.P.	5152	Pășune		
Încl: 3º		Exp:S		Alt: 430 m		Sol: Brun luvic tipic	
Date staț. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Agrostis capillaris</i> Acop. erbacee: 100%							
Gram: 75% (<i>Festuca r.</i> 40%, <i>Agrostis c.</i> 20%, <i>Phleium p.</i> 5%, <i>Lolium p.</i> 5%, <i>Dactylis g.</i> 5%)							
Leg: 7% (<i>Trifolium sp.</i>)							
Div. pl: 15% (<i>Achillea m.</i> 3%, <i>Taraxacum of.</i> 3%, <i>Alchemilla m.</i> 4%, <i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Thymus m.</i> 2%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 3% (<i>Carduus a.</i> 2%, <i>Urtica d.</i> 1%)							
Val. past: Bună		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp: Volum:	
Date compl: Rare exemplare de păducel. Mușuroaie pe 1%.							
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Distrugerea și nivelarea mușuroaielor. Supraînsămânțări. Fertilizări.							



Tr. păș.	U.a.	Supraf. - ha -	Gr. funcț.	T.S.	Categoria de folosință	Unit. Relief Luncă	Config. Plană
5	52	2,0	F.P.	5152	Pășune		
Încl: 3 ^a		Exp:S		Alt: 430 m		Sol: Brun luvic tipic	
Date stat. suplim:							
Tip pajiște: <i>Festuca rubra</i> – <i>Agrostis capillaris</i> Acop. erbacee: 100%							
Gram: 45% (<i>Festuca r.</i> 20%, <i>Agrostis c.</i> 15%, <i>Agropiron c.</i> 10 %)							
Leg: 5% (<i>Trifolium sp</i>)							
Div. pl: 10% (<i>Plantago sp.</i> 3%, <i>Taraxacum of.</i> 3%, <i>Achillea m.</i> 4%)							
Pl. dăunăt. – toxice: 40% (<i>Euphorbia sp.</i> 20%, <i>Carduus a.</i> 5%, <i>Urtica d.</i> 5%, <i>Deschampsia c.</i> 10%)							
Val. past: Slabă		Arbuști:		Gr. acop:		Răsp:	
Veget. forest:		Vârsta:		Consist:		Răsp:	
Date compl:		Mușuroaie de <i>Deschampsia</i> pe 10%. Izolat arbuști (măceș, păducel).					
Lucr. exec:							
Lucr. prop: Combaterea plantelor dăunătoare și toxice. Ditrugerea și nivelarea mușuroaielor.							






8.2. DESCRIERE PARCELARĂ TERENURI CU VEGETAȚIE FORESTIERĂ

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. % K	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
														Ha	Tot
1	1B	1,4	P.P.	5232	4282	ST	RN	60	1	26	17	4	0,5	16	22
Unit. relief: versant mijlociu Conf. ondulat Înc: 17 ⁹ Alt: 550 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Seminiș utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						CA	RN	60	7	22	17	4	2,6	88	123
						JU	RN	60	2	26	18	4	0,7	25	35
						Total		60	0,6			4	3,8	129	215
Date complementare : Diseminat: FA															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. % K	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
														Ha	Tot
1	1C	1,8	P.P.	5232	4282	CA	LT	40	10	18	16	3	6,4	117	216
Unit. relief: versant mijlociu Conf. ondulat Înc: 10 ⁹ Alt: 600 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Seminiș utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:															
						Total		40	0,8			3	6,4	117	216
Date complementare : Rari preexistenți de GO, FA, JU.															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. % K	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
														Ha	Tot
1	8B	6,3	F.P.	5232	4282	FA	RN	130	10	56	17	5	0,6	58	368
Unit. relief: versant mijlociu Conf. ondulat Înc: 10 ⁹ Alt: 620-650 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Seminiș utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop: Reducerea consistenței la 0,1.															
						Total		130	0,2			5	0,6	58	368
Date complementare : Diseminat: CA. Regenerare naturală de FA, CA de 5 ani/0,1S (pe lizieră).															



Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	8C	27,2	F.P.	5152	5231	GO	RN	130	5	52	16	5	0,2	24	653
Unit. relief: versant superior Conf. ondulat Încl: 15°Exp: SE Alt: 640-720 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Seminiș utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop: Reducerea consistenței la 0,1.						FA	RN	130	4	56	18	5	0,3	41	1115
						CA	RN	100	1	38	15	5	0,1	5	136
						Total		130	0,2			5	0,6	70	1904
Date complementare : Diseminat: ME.															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	12C	24,6	F.P.	5152	5231	FA	RN	130	7	58	17	5	0,4	41	1008
Unit. relief: versant superior Conf. ondulat Încl: 15°Exp: NE Alt: 700-750 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Seminiș utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop: Reducerea consistenței la 0,1.						GO	RN	130	2	52	15	5	0,1	10	246
						CA	RN	100	1	40	15	5	0,1	5	123
						Total		130	0,2			5	0,6	56	1377
Date complementare :															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	12D	5,9	P.P.	5232	4282	FA	RN	120	2	52	24	4	0,6	55	325
Unit. relief: versant inferior Conf. ondulat Încl: 25°Exp: NE Alt: 690 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun eumezobazic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Seminiș utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						FA	RN	90	4	34	20	4	1,8	93	549
						CA	LT	70	3	28	19	4	1,1	49	289
						ME	RN	50	1	22	17	4	0,3	13	77
						Total		90	0,7			4	3,8	210	1240
Date complementare : Diseminat: GO, PLT.															



Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	13B	11,8	P.P.	5152	5231	CA	LT	60	5	22	17	4	2,4	84	989
Unit. relief: versant Conf. ondulat Încl: 20° Exp: SV Alt: 640 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						FA	LT	60	2	24	17	4	1,3	37	435
						GO	LT	60	2	24	16	4	0,9	29	341
						ME	RN	60	1	26	18	4	0,3	14	165
						Total		60	0,8			4	4,9	164	1930
Date complementare : Rare exemplare bătrâne de FA, CA															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	13C	6,1	P.P.	5232	4282	FA	RN	130	2	60	27	4	0,5	49	301
Unit. relief: versant Conf. ondulat Încl: 20° Exp: V Alt: 680 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						GO	RN	130	1	54	20	4	0,2	21	129
						CA	RN	110	1	40	17	4	0,3	18	111
						FA	LT	110	5	42	25	4	1,4	113	694
						FA	LT	50	1	22	15	4	0,5	11	68
						Total		110	0,6			4	2,9	212	1303
Date complementare : Diseminat: ME. Prăjiniș – păriș de FA, CA /0,2S. Consistența: 0,4-0,7.															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	13D	3,9	P.P.	5232	4282	FA	RN	120	6	54	27	3	2,1	215	839
Unit. relief: versant Conf. ondulat Încl: 20° Exp: V Alt: 640 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						FA	RN	90	3	40	24	3	1,5	92	359
						FA	RN	50	1	22	16	3	0,7	18	70
						Total		120	0,7			3	4,3	325	1268
						Date complementare : Diseminat: ME.									



Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	14D	3,5	P.P.	5232	4282	FA	RN	80	2	38	21	4	1,5	61	212
Unit. relief: versant mijlociu Încl: 25° Alt: 560-670 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic litic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						CA	LT	30	5	18	14	4	3,3	55	191
						FA	LT	30	2	20	14	4	2,5	30	104
						JU	LT	30	1	20	13	4	0,7	11	38
						Total		30	1,0			4	8,0	157	545
Date complementare : Diseminat: ME, GO, PLT, CI.															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	15B	19,7	P.P.	5152	5231	FA	RN	130	2	56	24	4	0,4	57	1122
Unit. relief: versant Încl: 20° Alt: 640-700 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						GO	RN	130	2	58	20	4	0,4	49	964
						FA	LT	90	3	36	20	4	1,4	70	1378
						CA	LT	70	2	30	19	4	0,8	33	649
						ME	RN	50	1	24	17	4	0,3	13	256
						Total		90	0,7			4	3,3	222	4369
Date complementare : Diseminat: ME, GO, PLT, CI.															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	16B	6,6	P.P.	5232	4282	FA	RN	130	2	54	28	3	0,6	74	487
Unit. relief: versant superior Încl: 20° Exp: SE Alt: 730-770 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						GO	RN	130	1	40	23	3	0,2	33	217
						FA	LT	110	6	40	27	3	2,4	207	1362
						CA	LT	40	1	20	16	3	0,6	13	86
						Total		110	0,7			3	3,8	327	2152
Date complementare : Diseminat: ME, PLT, ANN.															



Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	16C	15,2	P.P.	5232	4282	CA	LT	40	3	20	16	3	1,9	44	671
Unit. relief: versant Conf. ondulat Încl: 20° Exp: E Alt: 580-660 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						FA	LT	40	1	20	16	3	0,8	15	229
						ME	RN	40	1	24	18	3	0,6	16	244
						CA	LT	10	3	4	3	4	1,3	6	91
						ME	LT	10	1	6	4	3	0,2	1	15
						SAC	RN	10	1	4	3	3	1,2	9	137
						Total		40	0,8			3	6,0	91	1387
Date complementare : Diseminat: PLT, JU, PAM, ANN. Rare exemplare bătrâne de FA și CA.															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	16D	9,0	P.P.	5132	5231	GO	RN	120	1	42	24	3	0,3	32	290
Unit. relief: versant Conf. ondulat Încl: 20° Exp: S Alt: 660 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						FA	RN	120	2	56	27	3	0,7	72	652
						FA	LT	90	5	40	25	3	2,8	153	1385
						CA	LT	40	2	22	17	3	1,1	25	226
						Total		90	0,7			3	4,9	282	2553
Date complementare : Diseminat: PAM, ANN.															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	17D	48,7	P.P.	5232	4282	CA	LT	40	4	20	15	3	2,9	66	3213
Unit. relief: versant Conf. ondulat Încl: 20° Exp: N Alt: 620-660 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						FA	LT	40	1	20	15	3	0,9	17	828
						ME	RN	40	2	24	16	3	1,2	35	1704
						PLT	RN	40	1	24	16	3	0,5	22	1071
						ME	RN	20	1	8	6	3	0,6	7	341
						ANN	RN	40	1	26	17	3	0,5	22	1071
						Total		40	0,9			3	6,6	169	8228
Date complementare : Rare exemplare bătrâne de GO, CA, FA. Diseminat: GO.															



Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	18B	60,0	P.P.	5232	4282	CA	LT	40	3	20	15	3	2,4	55	3301
Unit. relief: versant Conf. ondulat Încl: 20° Exp: N Alt: 580-660 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semînțis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						ME	RN	40	4	22	17	3	2,8	78	4682
						ANN	RN	40	2	24	17	3	1,0	49	2941
						PLT	RN	40	1	24	18	3	0,5	25	1501
						Total		40	1,0			3	6,7	207	12425
Date complementare : Diseminat: FA, GO, JU.															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	19B	49,8	P.P.	5232	4282	CA	RN	60	3	26	19	3	1,9	67	3337
Unit. relief: versant Conf. ondulat Încl: 20° Exp: V Alt: 580-620 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semînțis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						FA	LT	60	1	28	19	3	0,9	28	1395
						CA	LT	30	4	16	14	3	2,9	50	2491
						ME	RN	20	1	16	15	3	0,6	7	349
						SAC	RN	20	1	16	13	3	1,4	17	847
						Total		30	0,9			3	7,7	169	8419
Date complementare : Diseminat: PLT, CI, GO, ANN.															


Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	20B	13,0	P.P.	5132	5231	GO	RN	50	2	24	16	3	1,2	34	441
Unit. relief: versant Conf. ondulat Încl: 23° Exp: SV Alt: 550-620 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic litic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semînțis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						PI	RN	50	2	26	18	3	0,9	43	558
						CA	RN	50	4	22	17	3	2,4	70	909
						FA	RN	50	1	22	17	3	0,8	20	260
						ANN	RN	50	1	26	18	3	0,2	22	286
						Total		50	0,8			3	5,5	189	2454
Date complementare : Diseminat: PLT, CI, ME, ANN.															



Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	23B	12,5	P.P.	5132	5231	ST	RN	130	1	52	23	4	0,3	29	362
Unit. relief: versant inferior Încl: 17° Alt: 600-650 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințș utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						CA	RN	100	1	38	21	4	0,3	23	287
						ANN	LT	50	1	26	20	4	0,2	18	224
						CA	LT	30	7	18	14	3	4,5	78	973
						Total		30	0,8			4	5,3	148	1846
Date complementare : Diseminat: ME, FA, JU, PAM.															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	24B	8,8	P.P.	5232	4282	CA	LT	40	4	18	15	3	2,9	66	581
Unit. relief: versant inferior Încl: 20° Exp: NE Alt: 630 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințș utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						FA	LT	40	1	18	15	3	0,9	17	150
						ME	RN	40	2	20	17	3	1,2	35	308
						PLT	RN	40	1	22	17	3	0,5	22	164
						ANN	LT	40	2	22	16	3	0,9	44	387
						Total		40	0,9			3	6,4	184	1620
Date complementare : Diseminat: GO, JU, CI.															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	25B	30,4	P.P.	5232	4282	CA	LT	50	4	22	18	3	2,1	61	1856
Unit. relief: versant inferior Încl: 20° Exp: NV Alt: 600-660 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințș utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						FA	LT	50	1	20	18	3	0,7	18	548
						ANN	LT	50	2	26	19	3	0,4	39	1187
						ME	RN	50	2	24	19	3	0,7	33	1004
						PLT	RN	50	1	26	20	3	0,2	19	578
						Total		50	0,7			3	4,1	170	5173
Date complementare : Consistența variabilă: 0,6-0,9. Diseminat: GO, JU, TE, CI.															



Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Crest crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	25C	9,7	P.P.	5232	4282	CA	LT	50	3	20	17	3	1,8	53	515
Unit. relief: versant superior Conf. ondulat Încl: 20° Exp: V Alt: 600-680 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						JU	RN	50	1	22	17	3	0,6	18	175
						ME	RN	50	2	24	18	3	0,8	38	369
						PLT	RN	50	1	24	19	3	0,2	22	214
						ANN	LT	50	2	22	19	3	0,4	44	472
						FA	LT	50	1	20	18	3	0,8	20	194
						Total		50	0,8			3	4,6	195	1939
Date complementare :															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Crest crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	26B	18,6	P.P.	5232	4282	CA	LT	50	4	22	16	4	2,2	57	1057
Unit. relief: versant Conf. ondulat Încl: 20° Exp: NE Alt: 620-720 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						FA	LT	50	2	22	17	3	1,6	40	742
						JU	RN	50	1	24	17	3	0,6	18	334
						ANN	LT	50	2	26	18	3	0,4	44	816
						ME	RN	50	1	24	18	3	0,4	19	352
						Total		50	0,8			3	5,2	178	3301
						Date complementare : Consistența variabilă: 0,7-1,0. Diseminat: SAP, PLT, GO, TE. Variație de vârste: 40-80 ani.									


Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Crest crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	27B	33,0	P.P.	5132	5231	FA	LT	60	2	26	18	4	1,3	37	1220
Unit. relief: versant Conf. ondulat Încl: 25° Exp: NV Alt: 560 - 680 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic litic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						CA	LT	60	3	24	18	4	1,5	50	1648
						GO	RN	60	1	24	16	4	0,5	14	461
						ANN	LT	50	2	20	17	4	0,3	36	1187
						ME	RN	50	1	22	17	4	0,4	14	461
						PLT	RN	50	1	24	18	4	0,2	18	593
						Total		60	0,8			4	4,2	169	5570
Date complementare : Diseminat: JU, TE, SAP.															



Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	28B	15,0	P.P.	5132	5231	CA	LT	60	5	26	17	4	2,4	84	1257
Unit. relief: versant Încl: 25° Alt: 600 - 690 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic litic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						FA	LT	60	2	26	17	4	1,3	37	554
						GO	LT	60	1	24	17	4	0,5	14	209
						ME	RN	60	1	26	19	4	0,3	14	209
						ANN	RN	60	1	28	18	4	0,1	19	284
						Total		60	0,8			4	4,6	168	2307
Date complementare : Diseminat: SAP, JU, TE, PLT.															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	29B	22,6	P.P.	5132	5231	CA	LT	60	3	24	17	4	1,5	50	1131
Unit. relief: versant inferior Încl: 25° Alt: 560 - 620 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic litic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						ANN	LT	60	1	28	19	4	0,1	19	430
						FA	RN	60	2	26	17	4	1,3	37	837
						GO	RN	60	1	24	16	4	0,5	14	317
						ME	RN	60	2	26	19	4	0,6	29	656
						PLT	RN	60	1	28	20	4	0,1	19	430
						Total		60	0,8			4	4,1	168	3801
Date complementare : Diseminat: JU, SAP, CI, TE.															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
3	34C	5,4	F.P.	5232	4282	FA	RN	120	6	52	23	4	1,4	141	764
Unit. relief: versant mijlociu Încl: 20° Alt: 920 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun eumezobazic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						FA	RN	90	2	34	22	4	0,8	40	217
						FA	LT	50	2	26	17	4	1,0	22	119
						ME	RN	50	1	24	18	4	0,3	11	60
						Total		120	0,6			4	3,5	214	1160
Date complementare : Consistența variabilă: 0,5-0,8. Diseminat: PAM.															



Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	36B	21,0	P.P.	5232	4282	ANN	LT	50	6	24	17	4	1,0	108	2267
Unit. relief: versant Încl: 20° Alt: 610 - 690 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						CA	LT	50	2	20	15	4	1,1	29	609
						SAP	LT	50	1	22	16	4	0,1	14	294
						JU	RN	50	1	20	15	4	0,5	14	294
						Total		50	0,8			4	2,7	165	3464
Date complementare : Diseminat: PLT, GO, FA, ME.															

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	38B	16,9	P.P.	5132	5231	GO	RN	35	2	20	14	4	1,2	17	287
Unit. relief: versant Încl: 25° Alt: 600 - 700 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic litic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						CA	LT	35	4	18	14	4	2,4	46	778
						ME	RN	35	2	22	16	4	1,0	21	355
						JU	RN	35	1	20	15	4	0,6	12	203
						FA	LT	35	1	20	15	4	0,6	9	152
						Total		35	0,9			4	5,8	105	1775
Date complementare : Diseminat: ANN, PLT, CI. Variație de vârste: 30-50 ani.															


Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	44B	3,5	P.P.	5232	4282	SC	LT	40	10	20	17	3	5,5	125	436
Unit. relief: versant inferior Încl: 20° Alt: 480 - 560 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:															
						Total		40	0,7			3	5,5	125	436
Date complementare :															



Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fct.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	46C	0,5	P.P.	5232	4282	SC	LT	20	10	8	6	3	7,1	103	53
Unit. relief: versant inferior Încl: 25° Alt: 500 m Tip floră: Festuca drymeia Tip sol: brun luvic litic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:															
						Total		20	0,8			3	7,1	103	53
						Date complementare : Diseminat: ULM, JU, PR, Cl.									

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fct.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	49B	1,5	P.P.	5152	5231	SA	RN	50	10	3	10	4	-	54	83
Unit. relief: luncă Încl: 3° Alt: 500 m Tip floră: Festuca altissima Tip sol: Brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: 350 m Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop: Reducerea consistenței la 0,1.															
						Total		50	0,3			4	-	54	83
						Date complementare: Soc, Sânger, Păducel/0,3S. Regenerare de 5-10 ani de SC, ANN, SA/0,3S. Variații de vârste 30-60 ani. Diseminat SC, ANN.									

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fct.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	49C	1,1	P.P.	5152	5231	CA	LT	80	6	32	14	4	1,5	73	82
Unit. relief: versant mijlociu Încl: 15° Alt: 530m Tip floră: Festuca altissima Tip sol: Brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: 350 m Semințis utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						JU	LT	80	4	28	13	4	1,0	49	55
						Total		80	0,5			4	2,5	122	137
						Date complementare: Rari preexistenți de GO. Variație de vârste 40-140 ani. Diseminat TE, PAR. Mici goluri înierbate.									



Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	49D	1,7	P.P.	5152	5231	GO	LT	160	2	72	16	4	0,3	24	41
Unit. relief: versant mijlociu Încl: 15° Alt: 530 m Tip floră: Festuca altissima Tip sol: Brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: 350 m Semințș utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop: Tăieri de igienă						CA	LT	100	7	40	15	4	1,5	99	169
						JU	LT	100	1	32	14	4	0,2	14	24
						Total		100	0,5			4	2,0	137	234
						Date complementare: Variație de înclinare 10-20° Arboret de lăstari cu vitalitate foarte slabă.									


Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	49E	2,1	P.P.	5152	5231	GO	LT	160	2	72	16	4	0,3	24	51
Unit. relief: versant mijlociu Încl: 15° Alt: 530 m Tip floră: Festuca altissima Tip sol: Brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: 400 m Semințș utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:						CA	LT	100	8	40	15	4	1,7	114	243
						Total		140	0,5			4	2,0	138	294
						Date complementare: Variație de înclinare 10-20°. Diseminat TE, JU.									

Trup păș. Nr.	U.A.	Supr. - ha -	Cat. fcț.	T.S.	T.P.	Elem. arb.	Prov.	Vârsta - ani -	Prop. %	D cm	H m	Cl. prod.	Creșt crt. mc/an/ ha	Volum - mc -	
									K					Ha	Tot
1	49H	0,4	P.A.	5152	5231	GO	LT	140	10	46	15	4	0,7	71	30
Unit. relief: versant mijlociu Încl: 20° Alt: 550 m Tip floră: Festuca altissima Tip sol: Brun luvic tipic Vârsta exploatabilității: Dist. drum auto: 550 m Semințș utiliz: Lucr. exec: Lucr. prop:															
						Total		140	0,3			4	0,7	71	30
						Date complementare: Păducel, Alun pe 0,4S. Regenerare naturală de GO de 3-5 ani/0,1S. Diseminat PAR, JU, SA.									



8.3. EVIDENȚA LUCRĂRILOR DE EXECUTAT ÎN URMĂTORII 10 ANI


U.A.	Supraf. (ha)	Scos cioate		Distrugerea și nivelarea musuroaielor și a ramaturilor de mistret		Defrișarea vegetației arbustive și forestiere ≤ 20 ani		Combat plante dăunătoare		Supraînsămânțarea sau reînsămânțarea pajiiștilor		Fertilizarea pajiiștilor	
		Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.
1A	5.9												
1D	18.3												
2	56.7												
3	46.0												
4	75.2												
5A	24.5												
5B	30.6												
6A	40.2												
	5.0												



[illegible]

(Continuare)

U.A.	Supraf. (ha)	Scos cioate		Distrugetura și nivelarea musuroaielor și a ramaturilor de mistret		Defrișarea vegetației arbustive și forestiere ≤ 20 ani		Combat plante dăunătoare		Supraînsămânțarea sau reînsămânțarea pajștilor		Fertilizarea pajștilor	
		Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.
8A	17.0												
8B	6.3												
8C	27.2												
9	31.6												
10	25.7												
11	42.5												
12A	19.8												
12B	21.3												
12C	24.6												
13A	54.6												



(Continuare)

U.A.	Supraf. (ha)	Scos cioate		Distrugetura și nivelarea musuroaielor și a ramaturilor de mistret		Defrișarea vegetatiei arbustive și forestiere s 20 ani		Combat plante dăunătoare		Suprainșământarea sau reinsământarea pajiiștilor		Fertilizarea pajiiștilor	
		Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.
14A	16.3												
14B	21.7												
14C	9.2												
15A	47.5												
16A	53.5												
17A	14.9												
17B	5.1												
17C	19.3												
18A	12.3												
19A	19.1												
20A	41.9												

(Continuare)

U.A.	Supraf. (ha)	Scos cioate		Distrugerea și nivelarea musuroaielor și a ramaturilor de mistret		Defrișarea vegetatiei arbustive și forestiere ≤ 20 ani		Combat plante dăunătoare		Supraînsămânțarea sau reînsămânțarea pajiștilor		Fertilizarea pajiștilor	
		Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.
21	56.7												
22	52.3												
23A	59.5												
24A	43.4												
25A	46.6												
26A	66.4												
27A	66.9												
28A	26.7												
29A	37.4												
30	20.5												
31	43.6												



(Continuare)

U.A.	Supraf. (ha)	Scos cioate		Distrugerea și nivelarea musuroaielor și a ramaturilor de mistret		Defrișarea vegetatiei arbustive și forestiere ≤ 20 ani		Combat plante dăunătoare		Supraînsămânțarea sau reînsămânțarea pajștilor		Fertilizarea pajștilor	
		Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.
32	46.4												
33	53.4												
34A	65.7												
34B	12.1												
35	27.9												
36A	53.2												
37	94.6												
38A	46.3												
39	35.0												
40	55.1												
41	71.3												



(Continuare)

U.A.	Supraf. (ha)	Scos cioate		Distrugerea și nivelarea musuroaielor și a ramaturilor de mistret		Defrișarea vegetației arbustive și forestiere ≤ 20 ani		Combat plante dăunătoare		Supraînsămânțarea sau reînsămânțarea pajiștilor		Fertilizarea pajiștilor	
		Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.	Anul	Supraf.
42	67.5												
43	52.3												
44A	102.0												
45	39.6												
46A	96.9												
46B	7.8												
47	83.0												
48 A	0.9												
48 B	11.8												
49 A	3.5												
49 B	1.6												



ANEXE



ROMÂNIA
PREFECTURA JUDEȚULUI COVASNA

1529 2 oct 2002

ORDIN

privind trecerea în proprietatea privată a comunei Aita Mare a terenurilor aflate
pană în prezent în administrarea Consiliului local Aita Mare
și înscrise în anexa 16 Aita Mare

Prefectul județului Covasna,
analizând referatul nr. 12.195/2002 al Secretarului general de prefectură, prin
care se propune trecerea în proprietatea privată al comunei Aita Mare a terenurilor
aflate până în prezent ca izlaz comunal în administrarea Consiliului local Aita Mare și
validate pe anexa 16 Aita Mare,

având în vedere cererea Primăriei comunei Aita Mare, prin care se solicită
emiterea Ordinului Prefectului pentru trecerea în domeniul privat al comunei Aita
Mare a suprafeței totale de 347,70 ha teren agricol, izlaz comunal,

în temeiul art.27 din regulamentul privind procedura de
atribuție și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate,
precum și punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin H.G. nr.1172/2001

în temeiul art.137 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, emit prezentul

ORDIN

Art.1 – Se trec în proprietatea privată al comunei Aita Mare terenurile
agricole, izlaz comunal, aflate până în prezent în administrarea Consiliului local al
comunei Aita Mare și care sunt înscrise și validate de Comisia județeană Covasna
pentru aplicarea legilor fondului funciar pe anexa 16 Aita Mare în suprafață de 347,70
ha, această anexă constituind partea integrantă din prezentul Ordin.

Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentului Ordin se însărcinează
Secretarul general de prefectură, iar cu difuzarea Biroul resurse umane și relații cu
publicul din cadrul Prefecturii județului Covasna.

PREFECT,

Horia Grama

Sântu Gheorghe, la 30.09.2002
Nr. 155



T A B E L
cuprinzând reconstituirea izlazurilor comunale, conform prevederilor legii,
care vor fi date în administrarea consiliilor locale

Nr. crt.	Localitatea și trupul de pașune	Suprafața existentă în administrarea consiliului local			Suprafața ce se preia din folosința cooperativelor agricole -ha-			Suprafața ce se preia din terenurile transmise unităților de stat -ha-			Suprafața totală a izlazului comunal reconstituit -ha-		
		Total, din care:	Arabil	Pajiști	Total, din care:	Arabil	Pajiști	Total, din care:	Arabil	Pajiști	Total, din care:	Arabil	Pajiști
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
AITA MARE													
1	NAGYHÁGÓ	53,4	-	53,4	-	-	-	-	-	-	53,4	-	53,4
AITA MEDIE													
2	LÜGET	294,3	-	294,3	-	-	-	-	-	-	294,3	-	294,3
	TOTAL COMUNA	347,7	-	347,7	-	-	-	-	-	-	347,7	-	347,7



COMISIA JUDEȚEANĂ PENTRU STABILIREA DREPTULUI
DE PROPRIETATE ASUPRA TERENURILOR

Județul..... COVASNA
Nr. 47104

Codul..... 63777

TITLU DE PROPRIETATE

Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor,
pe baza propunerii comisiei comunale, orașenești sau municipale și a prevederilor
Legii fondului funciar nr. 18/1991, ale Legii nr. 1/2000 și ale Legii nr. 247/2005,
cu modificările ulterioare,

DECLARĂ

Cetățeanul/Cetățeană..... COMPOSESORATUL AITA MARE

(moștenitorii defunctului/defunctei).....

din satul..... comuna/orașul..... AITA MARE

municipiul..... județul..... COVASNA

primește în proprietate o suprafață totală de..... 109 8100ha..... mp, din care:

-prin reconstituirea dreptului de proprietate..... 109 8100ha..... mp;


-prin constituirea dreptului de proprietate..... 0 0000ha..... mp,

situată pe teritoriul comunei..... AITA MARE
structurată și amplasată conform
celor menționate pe verso.

Proprietarul va exercita asupra celor de mai sus toate drepturile și obligațiile ce
decurg din lege.



DIRECTOR
AL OFICIULUI DE CADASTRU ȘI
PUBLICITATE IMOBILIARĂ
ing. Felician USACHE



Valabil însoțit de anexă

ROMANIA

SUPRAFAȚA PRIMITĂ ÎN PROPRIETATE

A. SUPRAFAȚA PRIMITĂ ÎN EXTRAVILAN

Nr. RT.	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	NR. TOPOGRAFIC		SUPRAFAȚĂ		VECINĂȚĂȚI				OBSE
		TARLA (SOLĂ)	PARCELĂ	Ha	mp	NORD	EST	SUD	VEST	
1	Arabil									
2	Vii									
3	Livezi									
4	Pășuni	15	701	2	0097	DIG. PR. AITA	CD 684	F 694	DIG PR. OLT	1stbk
		12	573/1	11	7570	DRUM	DE 615	PR. AITA	INTRAVILAN	Szeg
		12	573/2	0	8610	A 570	A 570	PR. AITA	DE 615	Szeg
		13	595/1	0	2969	PR. AITA	PR. AITA	P 604/1	PR. AITA	Szeg
		13	595/2	2	1348	P 604/1	604/1	P 597/11	P 595/3	Szeg
		13	597/11	5	2685	P 595/2	P 605/2	A 597	A 597	Szeg
		13	600	1	7166	P 604/1	P 604/1	P 605/2	P 604/1	Szeg
		13	604/1	17	6579	PR. AITA	DE 615	P 605/2	P 595/3	Szeg
		13	604/2	3	5101	P 610	P 613	DE 615	DE 615	Szeg
		13	605/2	12	8987	P 614	A 605	P 597/11	P 604/1	Szeg
		13	606	1	1167	P 604/1	P 604/1	P 604/1	P 604/1	Szeg
		13	610	1	5440	PR. AITA	P 613	P 604/2	PR. AITA	Szeg
		1	37	11	2198	HB 36	HB 36	HB 36	DIG PARAUL OLT	Nagy
		1	38	3	4471	HB 36	DE 41	DIG PR. OLT	DIG PR. OLT	Nagy
		15	700	33	0817	CD 684	A 699	HB 691	CD 684	
		13	614	0	4214	P 604/1	DE 615	P 605	P 605/2	
5	Fânețe									
6	Păduri									
7	Alte ter. neagr.	15	695	0	6984	P 700	HB 691	HB 691	HB 691	1stbk
		13	593	0	1697	PR. AITA	PR. AITA	P 604/1	PR. AITA	Szeg
TOTAL				109	8100					

B. SUPRAFAȚA PRIMITĂ ÎN INTRAVILAN

Nr. RT.	CATEGORIA DE FOLOSINȚĂ	NR. TOPOGRAFIC		SUPRAFAȚĂ		VECINĂȚĂȚI				OBSE
		TARLA (SOLĂ)	PARCELĂ	Ha	mp	NORD	EST	SUD	VEST	
1	Arabil									
2	Vii									
	Livezi									
4	Pășuni									
5	Fânețe									
6	Curți construcții									
7	Alte terenuri									
TOTAL				0	0000					

TOTAL GENERAL (A+B) 109 Ha 8100 mp

din care:

ARABIL	0	Ha	0000	mp
VII	0	Ha	0000	mp
LIVEZI	0	Ha	0000	mp
PĂȘUNI	108	Ha	9419	mp
FÂNEȚE	0	Ha	0000	mp
PĂDURI	0	Ha	0000	mp
CURȚI, CONSTRUCȚII	0	Ha	0000	mp
ALTE TERENURI	0	Ha	8681	mp




UAT Comuna Aita Mare
Jud. Covasna

Nr. înregistrare: 59 / 09.05.2019

PROCES VERBAL
AL CONFERINTEI I DE AMENAJARE A FONDULUI PASTORAL
DE PE RAZA UNITĂȚII TERITORIALE ADMINISTRATIVE

AITA MARE, JUD. COVASNA

Subsemnatii:

- | | | |
|---------------------------|--|--|
| 1)- Domnul Bihari Edömér | - primar Comuna Aita Mare |  |
| 2)- Domnul Laszlo József | - D.A.J. Covasna | |
| 3)- Domnul Barabás András | - viceprimar Comuna Aita Mare | |
| 4)- Doamna Toók Emese | - Registrul Agricol Comuna Aita Mare |  |
| 5)- ing. Vodă Alexandru | - sef proiect SC EUROSILV SRL Braşov | |
| 6)- ing. Raclariu Ioan | - proiectant | |

În conformitate cu prevederile normelor tehnice pentru amenajarea păşunilor, ne-am întrunit în scopul avizării temei de proiectare pentru pajiştile permanente de pe raza unităţii teritorial administrative Aita Mare.

În urma analizei şi discuţiilor purtate am constatat următoarele:

1. Suprafaţa fondului pastoral

Suprafaţa pajiştilor care urmează a fi amenajată este de aproximativ 1910,0 ha, repartizată în următoarele trupuri de păşune:

- 1 – Trupul Aita Mare (în suprafaţă de 110,0 ha);
 - 2 – Trupul Aita Medie (în suprafaţă de 1707,0 ha);
 - 3 – Trupul Ulaku (în suprafaţă de 8,0 ha);
 - 4 – Trupul Culmea Ascuţită (în suprafaţă de 85,0 ha);
- Total general1910,0 ha.

Suprafaţa finală a prezentului studiu se va stabili după parcurgerea terenului şi identificarea tuturor trupurilor de pajişti la nivel de U.A.T.



2. Documente privind proprietatea

Documentele privind proprietatea sunt reprezentate de Hotararea Comisiei Judetene pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Covasna Anexa 16- Aita Mare, titluri de proprietate, procese verbale de punere în posesie și extrase de carte funciară cuprinse ca anexă la prezenta lucrare.

3. Constituirea UAT Aita Mare

Suprafața pajiștilor analizate este dispusă în cadrul mai multor trupuri care totalizează aproximativ 1910,0 ha. Se vor reconstitui și materializa limitele de hotar cu alți proprietari prin confruntarea cu evidentele cadastrale și cu situația reală din teren, luând în considerare că mare parte din hotare sunt delimitate prin șanțuri sau prin movile de pietre.

4. Baza cartografica

Baza cartografica este constituita din planuri 1:5.000 sau 1:10.000, baza tare.

5. Modul de folosință

Modul de folosință a pajiștilor de pe teritoriul ce urmează a fi amenajat conform legislației în vigoare va fi de pășune și fânețe și se va menține în perioada de aplicare a prezentului studiu pastoral.

6. Starea pășunilor

Starea pășunilor se va caracteriza în funcție de situația concretă din teren.

7. Probleme speciale

Suprafața finală a prezentului studiu se va stabili după parcurgerea terenului și identificarea tuturor trupurilor de pajiști la nivel de U.A.T.

Se vor identifica toate suprafețele unde vegetația forestieră are vârsta peste 20 de ani, iar consistența medie este cel puțin 0.4, respectiv pășunile împădurite care se vor introduce ulterior în fond forestier.

Procesul verbal s-a încheiat în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.



1791/19.12.2019

S.C. EUROSILV SRL
Nr. /

PROCES VERBAL

al Conferinței a II-a de amenajare privind amenajamentul fondului pastoral
proprietate privată aparținând Comunei Aita Mare,
Composesoratului Aita Mare, Parohiilor Catolică, Reformată și Unitariană și
persoane fizice, comuna Aita Mare, județul Covasna

Participanți:

1. Dl. Bihari Edomer – Primar Comuna Aita Mare
2. Dl Laszsló József – D.A.J. Covasna.....
3. Dl Barabas Andras – Viceprimar Comuna Aita Mare.....
4. Doamna Toók Emese – Registrul Agricol Comuna Aita Mare.....
5. ing Vodă Alexandru – șef proiect SC Eurosylv SRL.....
6. ing. Raclariu Ioan – proiectant



În conformitate cu prevederile din "Ghidul de întocmire a amenajamentelor pastorale" întocmit de Institutul de Cercetare – Dezvoltare pentru Pajiști Brașov în anul 2014, ne-am întrunit pentru a analiza și aviza planurile de cultură și exploatare ale amenajamentului fondului pastoral proprietate privată situat pe raza UAT Aita Mare, județul Covasna.

1. Suprafața fondului pastoral:

Suprafața totală a fondului pastoral proprietate privată care face obiectul prezentului amenajament silvopastoral este de 2948,2 ha, conform documentelor de proprietate atașate, respectiv:

- **Ordinul Prefectului nr 1529 / 02.10.2002** pentru suprafața de 347,7 ha, proprietar comuna Aita Mare;
- **Titlu de proprietate nr. 47104 / 17.05.2013** pentru suprafața de 109,81 ha, proprietar Composesoratul Aita Mare ;
- **Titluri de Proprietate** pentru suprafața de 25,0 ha, proprietari Parohiile Catolică, Reformată și Unitariană Aita Mare;
- **Titluri de proprietate** pentru suprafața de 2465, 69 ha proprietari persoane fizice din comuna Aita Mare.



2. Gruparea pășunilor pe trupuri

Trupul de pășune		Parcele componente	Suprafața - ha -
Nr. crt.	Denumire		
1.	Aita	1, 2, 4– 33, 36 – 49	2740,6
2.	Aita Mare	3	46,0
3.	Dealul lui Matei	34	83,2
4.	Dealul Belin	35	27,9
5.	Lângă Olt	50 - 52	50,5
TOTAL		-	2948,2

Suprafața pășunilor amenajate este formată din următoarele categorii funcționale :

F.P. – pășuni (pajiști) cu funcție prioritară de producție.....	893,0 ha;
F.P. – fâneață cu funcție prioritară de producție.....	1536,0 ha;
F.P. – pășuni cu arbori cu funcție prioritară de producție.....	59,6 ha;
P.A. – pășuni cu arbori cu funcție prioritară de protecție a apelor.....	0,4 ha;
P.P. – pășuni împădurite cu funcție prioritară de producție.....	305,4 ha;
P.P. – fânețe împădurite cu funcție prioritară de producție.....	153,8 ha;
TOTAL GENERAL.....	2948,2 ha.

În cuprinsul pășunilor analizate au fost identificate 15 tipuri de pajiște prezentate în continuare. Tipul de pajiște s-a indicat printr-o singură specie când aceasta a fost majoritară sau prin două specii când ele au avut participări < 50%.

Tipurile de pajiște identificate sunt următoarele:

1. <i>Festuca rubra</i> – <i>Agrostis capillaris</i>	251,7 ha (10%)
2. <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Festuca rubra</i>	751,3 ha (30%)
3. <i>Festuca rubra</i>	129,7 ha (5%)
4. <i>Festuca rubra</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i>	344,8 ha (14%)
5. <i>Arrhenatherum elatius</i> – <i>Festuca rubra</i>	259,6 ha (10%)
6. <i>Festuca rubra</i> – <i>Nardus stricta</i>	70,7 ha (3%)
7. <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Calamagrostis epigeios</i>	149,5 ha (6%)
8. <i>Nardus stricta</i> – <i>Festuca rubra</i>	17,4 ha (1%)
9. <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Arrhenatherum elatius</i>	298,3 ha (12%)
10. <i>Agrostis capillaris</i> – <i>Deschampsia caespitosa</i>	43,4 ha (2%)
11. <i>Calamagrostis epigeios</i>	12,1 ha (1%)
12. <i>Arrhenatherum elatius</i> - <i>Agrostis capillaris</i>	71,3 ha (3%)
13. <i>Arrhenatherum elatius</i> – <i>Dactylis glomerata</i>	67,5 ha (3%)
14. <i>Trifolium pratense</i>	3,5 ha
15. <i>Deschampsia caespitosa</i>	18,2 ha (1%)
TOTAL.....	2489,0 ha (100%)



Tehnologiile de recuperare, îmbunătățire, întreținere și exploatare sunt conformate cu instrucțiunile și ultimele rezultate ale cercetării din domeniul culturii pajiștilor, în funcție de tipurile existente. Astfel în fondul pastoral analizat s-au propus următoarele lucrări:

- scoaterea cioatelor pe o suprafață de 5,9 ha ;
- distrugerea și nivelarea mușuroaielor vegetale și a rămăturilor de mistreț pe o suprafață de 103,4 ha ;
- defrișarea vegetației arbustive pe o suprafață de 204,5 ha ;
- defrișarea vegetației forestiere ≤ 20 de ani pe o suprafață de 38,7 ha;
- combaterea plantelor dăunătoare și toxice pe o suprafață de 172,5 ha;
- supraînsămânțări pe o suprafață de 506,8 ha;
- reînsămânțări pe o suprafață de 18,2 ha;
- fertilizări pe o suprafață de 2469,0 ha.
- semănat cu amestec de ierburi adecvate.

Bazele de amenajare stabilite pentru pășunile amenajate sunt următoarele :

- durata sezonului de pășunat este de 150 zile, între 15 mai – 15 octombrie, având în vedere zona geografică, condițiile climatice, altitudinea terenului, etc.
- numărul ciclurilor de pășunat este în număr de 4, fiecare cu 40 zile, din care 5-6 zile pentru pășunat și 34-35 pentru refacerea ierbii.
- producția medie de masă verde este de 8,4 t/ha funcție de tipul de pajiște, cu un coeficient de consumabilitate mediu de 75-80%

- capacitatea de pășunat actuală este de 0,86 UVM, funcție de valoarea pastorală a pajiștilor. În urma aplicării măsurilor de refacere propuse prin prezentul studiu, suprafața covorului ierbos va crește cu 249,1 ha (recuperată prin lucrări de defrișarea vegetației arbustive și forestiere, scos cioate) și se va îmbunătăți pe 275,9 ha, prin combaterea plantelor dăunătoare și toxice, distrugerea și nivelarea mușuroaielor și a rămăturilor de mistreț.

În urma aplicării măsurilor de îmbunătățire propuse prin prezentul studiu în următorii 5-10 ani se va ameliora atât compoziția floristică a pajiștilor cât și producția de masă verde la hectar, care va ajunge la 12 - 15 t. Prin creșterea coeficientului de consumabilitate la 85%, se va mări producția utilă de la 8,4 t / ha cât este în prezent la 11,0 t /ha. În final, se va ajunge la o încărcare medie de 1,12 U.V.M. / ha, ceea ce înseamnă 2451 U.V.M. pentru întreaga suprafață pășunabilă, mai mare decât în prezent cu 30%.

Terenurile cu vegetație forestieră însumează 519,2 ha, din care 459,2 ha pășuni și fânețe împădurite (consistența 0,4 și mai mare) și 60,0 ha pășuni cu arbori (consistența 0,2-0,3). Din ultima categorie proprietarul poate recolta lemn prin reducerea consistenței vegetației forestiere, funcție de panta terenului și starea pășunilor. Se va păstra vegetație forestieră cu consistența cel puțin 0,1 pentru adopostul și protecția animalelor. Astfel, din pășunile cu arbori de pe raza UAT Aita Mare se poate recolta cantitatea de 1970 mc masă lemnoasă.



PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

Întocmit astăzi 06.11.2019

Privind recepția lucrărilor de amenajare a pășunilor, faza teren, executate de grupul de lucru format conform Legii 86/2014 și a normativelor de punere în aplicare a prezentei legi, efectuate la suprafețele de pajiști de pe raza unității teritoriale administrative Aita Mare, județul Covasna.

Participanți:

1. Dl. ing. Benedek Gabor – reprezentant Garda Forestieră Județeană Covasna
2. Dl. Bihari Edömér – primar comuna Aita Mare
3. Dl. Laszló József – D.A.J. Covasna
4. Barabás András – viceprimar comuna Aita Mare
5. Toók Emese – Registrul Agricol comuna Aita Mare
6. Dl. ing. Vodă Alexandru – șef proiect SC Eurosiv SRL Brașov
7. Dl. ing. Raclariu Ioan – proiectant

Ca urmare a prevederilor legale privind amenajarea pajiștilor (Legea 86/2014), grupul de lucru format din dl. Bihari Edömér – primar comuna Aita Mare, dl. Laszló József – reprezentant D.A.J. Covasna, dl. Barabás András – viceprimar comuna Aita Mare, dna. Toók Emese – registrul agricol comuna Aita Mare, dl. ing. Vodă Alexandru – șef proiect SC Eurosiv SRL și dl. ing. Raclariu Ioan – proiectant a efectuat lucrările de amenajare a pajiștilor de pe raza UAT Aita Mare (suprafață totală – 1910,00 ha).

Au fost amenajate pajiștile din trupurile:

- Trupul 1 Aita Mare – 46,03 ha
- Trupul 2 Aita Medie – 1620,70 ha
- Trupul 3 Culmea Ascuțită – 83,14 ha
- Trupul 4 Ulaku – 27,86 ha
- Trupul 5 Valea Adâncă – 24,47 ha
- Trupul 6 Composesorat Aita Mare – 59,35 ha
- Trupul 7 Olt I – 33,78 ha
- Trupul 8 Olt II – 14,67 ha

Lucrările de amenajare au constat din:

- identificarea trupurilor de pășune;
- constituirea parcelarului și subparcelarului;
- ridicarea topografică în sistem GPS a parcelelor și subparcelelor;
- amplasarea de borne amenajistice;
- propunerea lucrărilor de efectuat pe întreaga perioadă a amenajamentului;
- descrierea vegetației ierboase;
- descrierea vegetației forestiere.

Aceste lucrări au fost efectuate conform normativelor în vigoare și anume: Legea 86/2014, Normele tehnice pentru amenajarea pădurilor, ediția 2000 și Ghidul de întocmire a amenajamentelor pastorale elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști Brașov, ediția 2014.

Lucrările topografice corespund din punct de vedere tehnic.

Acest proces verbal a fost încheiat în 5 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Reprezentant	Primar	D.A.J.	Viceprimar	Registrul	Șef	Proiectant
GFJ Covasna	Aita Mare	Covasna	Aita Mare	agricol	proiect	
ing. Benedek	dl. Bihari	dl. Laszló	dl. Barabás	dna. Toók	ing. Vodă	ing. Raclariu
Gabor	Edömér	József	András	Emese	Alexandru	Ioan









Beneficiar
Comuna Aita Mare
JUD. COVASNA

Proiectant
S.C. EUROSILV S.R.L.
BRAȘOV

**SITUAȚIA
CANTITĂȚILOR FIZICE REALIZATE ȘI SONDAJELE EFECTUATE LA
LUCRĂRILE DE DESCRIERE PARCELARĂ**

Anexa 1

U.A.T.	Descrieri Parcelare - Pajiști permanente			Executant
	Nr. parcele	Suprafata totală	Suprafata verificata,	
	-	ha	ha	
	u.a. verificate			
1	2	3	4	5
AITA MARE	42	1910,0	273,82	ing. Raclariu Ioan ing. Vodă Alexandru
	-			
	ua 7, 8A, 9, 27A, 28A, 29A, 30, 33			
TOTAL				-
	Concluzii :			

Anexa 2

U.A.T.	Descrieri Parcelare - Pășuni și fânețe împădurite			Executant
	Nr. parcele	Suprafata totală	Suprafata verificata,	
	-	ha	ha Minim 10 %	
	u.a. verificate			
1	2	3	4	5
AITA MARE	36	481,99	62,87	ing. Raclariu Ioan ing. Vodă Alexandru
			13%	
	ua 1B, 1C, 8B, 8C, 20B, 28B, 29B			
TOTAL				-
	Concluzii :			

Reprezentant
GFJ Covasna
ing. Benedek
Gabor

Primar
Aita Mare
dl. Bihari
Edömér

D.A.J.
Covasna
dl. Laszló
József

Viceprimar
Aita Mare
dl. Barabás
András

Registru
agricol
dna. Toók
Emese

Șef
proiect
ing. Vodă
Alexandru

Proiectant
ing. Raclariu
Ioan




Nr. 1542 din 06.11.2019

NOTĂ DE CONSTATARE
Întocmită astăzi 06.11.2019

Privind recepția lucrărilor de amenajare a pășunilor, faza teren, pentru fondul pastoral situat pe raza UAT Aita Mare, județul Covasna, de către grupul de lucru constituit în acest sens.

Participanți:

1. Dl. ing. Benedek Gabor – reprezentant Garda Forestieră Județeană Covasna
2. Dl. Bihari Edömér – primar comuna Aita Mare
3. Dl. Laszló József – D.A.J. Covasna
4. Barabás András – viceprimar comuna Aita Mare
5. Toók Emese – Registrul Agricol comuna Aita Mare
6. Dl. ing. Vodă Alexandru – șef proiect SC Eurosilv SRL Brașov
7. Dl. ing. Raclariu Ioan – proiectant

Ca urmare a prevederilor legale privind amenajarea pajiștilor (Legea 86/2014), grupul de lucru format din dl. Bihari Edömér – primar comuna Aita Mare, dl. Laszló József – reprezentant D.A.J. Covasna, dl. Barabás András – viceprimar comuna Aita Mare, dna. Toók Emese – registrul agricol comuna Aita Mare, dl. ing. Vodă Alexandru – șef proiect SC Eurosilv SRL și dl. ing. Raclariu Ioan – proiectant a efectuat lucrările de amenajare a pajiștilor de pe raza UAT Aita Mare (suprafață totală – 1910,0 ha).

Au fost identificate 481,99 ha terenuri acoperite cu vegetație forestieră din care:

- 270,18 ha pășuni împădurite;
- 153,67 ha fânețe împădurite;
- 58,14 ha pășuni cu arbori (consistența 0,2 - 0,3)

Conform legii 46/2008 (Codul Silvic) art.2, alin. 2, suprafața de 270,18 ha îndeplinește condiția de a fi inclusă în fond forestier.


**Reprezentant
GFJ Covasna**
ing. Benedek
Gabor



**Primar
Aita Mare**
dl. Bihari
Edömér



**D.A.J.
Covasna**
dl. Laszló
József



**Viceprimar
Aita Mare**
dl. Barabás
András



**Registrul
agricol**
dna. Toók
Emese



**Șef
proiect**
ing. Vodă
Alexandru



Proiectant
ing. Raclariu
Ioan



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ

Încheiat azi, 11.06.2019., cu ocazia lucrărilor de amenajarea pășunilor aparținând Comunei Aita Mare azi, data de mai sus s-a recepționat suprafața de 700 ha.

Beneficiarul declară, că lucrările de teren sunt executate conform Ghidului de întocmire a amenajamentelor pastorale (2014) elaborat de Institutul de Cercetare Dezvoltare Pajiști Brașov.

Beneficiar:

Comuna Aita Mare

Bihari Edomer



Prestator:

Eurosilv SRL

Vodă Alexandru



Notă:

pH:	<5.00-----sol puternic acid;
	5.01-5.80-----sol moderat acid;
	5.81-6.80-----sol slab acid;
	6.81-7.20-----sol neutru;
	7.21-8.40-----sol slab alcalin;
	>8.40-----sol moderat puternic alcalin.
Fosfor mobil :	<8.0 ppm-----sol foarte slab aprovizionat;
	8.1-18.0 ppm-----sol slab aprovizionat;
	18.1-36.0 ppm----sol moderat aprovizionat;
	36.1-72.0 ppm----sol bine aprovizionat;
	>72.0 ppm -----sol foarte bine aprovizionat.
Potasiu mobil:	<66.0ppm-----sol slab aprovizionat;
	66.1-132.0 ppm-----sol moderat aprovizionat;
	132.1-200.0 ppm----sol bine aprovizionat;
	>200.0 ppm-----sol foarte bine aprovizionat.
Azot total:	<0.100 %-----foarte slab aprovizionat;
	0.101-0.140 %-----sol slab aprovizionat;
	0.141-0.270 %-----sol moderat aprovizionat;
	0.271-0.600 %-----sol bine aprovizionat ;
	>0.600 %-----sol foarte bine aprovizionat.



Program cu publicul: luni-vineri 8³⁰ – 14.⁰⁰ Adresa: BRASOV, str. Calea Feldioarei nr 20B, cod postal 500483;

Tel: 0269441332, e-mail: ospabv@clicknet.ro

Rezultatele se referă numai la proba analizată. Documentul de față este proprietatea laboratorului O.S.P.A. BRASOV

*reproducerea și difuzarea documentului aparține în exclusivitate laboratorului O.S.P.A. BRASOV. Copiile sunt numerotate și controlate.



ROMÂNIA
JUDEȚUL COVASNA
COMUNA AITA MARE
CONSILIUL LOCAL



Anexa nr.2
la Hotărârea nr.62/2020

**PROCEDURA DE DISTRIBUIRE A EXTRASELOR
din Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente
ale comunei Aita Mare, județul Covasna**

Art.1. – Amenajamentul pastoral pentru pajiștile permanente ale comunei Aita Mare, județul Covasna, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Aita Mare nr.62/2020, este gestionat de Compartimentul agricol și de cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare.

Art.2. – (1) Măsurile tehnice, organizatorice și economice prevăzute în Amenajamentul pastoral, necesare ameliorării și exploatării pajiștilor comunei Aita Mare, situate în extravilan, se pun la dispoziția utilizatorilor de pășuni și fânețe.

(2) Conform dispozițiilor art.2, lit" d", din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.34/2013, cu modificările și completările ulterioare, prin utilizator de pășuni și fânețe se înțelege:

(i) crescător de animale, persoană fizică, având animalele înscrise în Registrul național al exploatațiilor (RNE)/crescător de animale, persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, având animale proprii sau ale fermierilor membri înscrise în RNE, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe, conform clasificării statistice a activităților economice în Uniunea Europeană pentru producția vegetală și animală, care deține legal dreptul de folosință asupra suprafeței agricole și care valorifică pășunea prin pășunare cu efective de animale sau prin cosire cel puțin o dată pe an; sau

(ii) persoană fizică ori persoană juridică de drept privat care are la dispoziție, în condițiile legii, suprafața agricolă, care desfășoară activități agricole specifice categoriei de folosință pășuni și fânețe și care o valorifică prin cosire cel puțin o dată pe an;

Art.3. – Extrasele din Amenajamentul pastoral (ce vor cuprinde cel puțin suprafața, capacitatea de pășunat, lucrările de întreținere a pajiștilor și perioadele de execuție a acestora) se distribuie utilizatorilor prin grija Compartimentului agricol și de cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare.

Art.4. – Extrasele din Amenajamentul pastoral se comunică persoanelor fizice/juridice, după achitarea taxei de **50 lei/ha**.

Art.5. – Instituțiilor/organelor cu atribuții de control li se comunică fără plată, la cerere, extrase din Amenajamentul pastoral.

Art.6. – Prezenta Procedură se aplică prin intermediul Compartimentului agricol și de cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Aita Mare și se actualizează în baza modificărilor legislative și a celor intervenite în structura organizatorică, prin hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Aita Mare.

